

IMPACTAÇÃO DOS INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES: RELATO DE CASO CLÍNICO

SOUZA, V. A. F.; FRANÇA, E. C.; NEVES, L. S.; DRUMMOND, A. F.; ZARZAR, P. M. P. A.

A hiperdontia é uma condição numérica mista rara e anômala na dentição na qual o número de dentes está aumentado além do normal. Muitas vezes, essa anomalia causa a retenção prolongada de dentes permanentes. O presente estudo teve por objetivo descrever um caso clínico de uma adolescente, de 10 anos, atendida no departamento de Odontopediatria e Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. A queixa apresentada relacionava-se ao constrangimento social devido à ausência dos incisivos maxilar superiores. Uma radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de feixes cônicos revelaram a presença de três dentes supranumerários em região maxilar anterior, impedindo a erupção de ambos os incisivos centrais superiores e ausência de espaço para erupção do canino permanente esquerdo (dente 23). Primeiramente, foram realizadas as exodontias dos dentes supranumerários e iniciou-se a Ortodontia Corretiva com aparelho fixo straight-wire a partir do qual foi realizado o alinhamento, nivelamento e abertura de espaço com mola aberta para favorecer a irrupção do dente 23. Conclusões: Os dentes anteriores possuem papel funcional e estético. Quando sua perda é precoce ou quando ausentes podem gerar dificuldades no convívio social. A demanda pelo tratamento multidisciplinar na odontologia avançou muito nos últimos anos, promovendo uma maior capacidade de assistência à população.