

Vinícius Veiga de Souza

**TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE NA OCORRÊNCIA DE
LESÕES EM CORREDORES: uma revisão da literatura**

Belo Horizonte

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional/UFI

2022

Vinícius Veiga de Souza

**TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE NA OCORRÊNCIA DE
LESÕES EM CORREDORES: uma revisão da literatura**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colegiado de Pós-Graduação em Fisioterapia da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de especialista em Fisioterapia esportiva.

Orientador: MSc Bruno Alvarenga Soares

Belo Horizonte

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional/UFMG

2022

S729t Souza, Vinícius Veiga de
2021 Treinamento intervalado de alta intensidade na ocorrência de lesões em
corredores: uma revisão da literatura. [manuscrito] / Vinícius Veiga de Souza – 2021.
22 f.: il.

Orientador: Bruno Alvarenga Soares

Monografia (especialização) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Bibliografia: f. 20-22

1. Treinamento intervalado. 2. Corridas. 3. Corredores (Esportes) – Ferimentos e
lesões. 4. Fisioterapia esportiva. I. Soares, Bruno Alvarenga. II. Universidade Federal
de Minas Gerais. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. III.
Título.

CDU: 615.8:796

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Iris da Silva. CRB6: 2283.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ESPECIALIZAÇÃO EM AVANÇOS CLÍNICOS EM FISIOTERAPIA



FOLHA DE APROVAÇÃO

**Treinamento intervalado de alta intensidade na ocorrência de lesões
emcorredores: uma revisão da literatura**

VINÍCIUS VEIGA DE SOUZA

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Banca Examinadora designada pela
Coordenação do curso de ESPECIALIZAÇÃO EM AVANÇOS CLÍNICOS EM
FISIOTERAPIA, do
Departamento de Fisioterapia, área de concentração FISIOTERAPIA ESPORTIVA.

Aprovada em 08 de maio de 2021, pela banca constituída pelos membros: Nayara Santos
Silva e Cecília Aquino.

Renan Alves Resende

Prof(a). Renan Alves Resende
Coordenador do curso de Especialização em Avanços Clínicos em Fisioterapia

Belo Horizonte, 08 de maio de 2021

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha família, à Universidade Federal de Minas Gerais e aos professores e orientadores pela oportunidade de concluir esse trabalho, e a todos que de alguma forma contribuíram para construção do mesmo.

RESUMO

Introdução: O Treino intervalado de alta intensidade ou High Intensity Interval Training (HIIT) é um treinamento tempo eficiente caracterizado por breves e repetidas sessões de exercício intenso, próximo a 100% da capacidade máxima do indivíduo intercaladas por período de repouso ou exercício de baixa intensidade. Especula-se que uma modalidade tão intensa como o HIIT poderia ser um dos fatores para gerar um maior número de lesões em corredores. **Objetivo:** Revisar, na literatura, estudos que registram lesões provocadas pelo treinamento intervalado de alta intensidade em praticantes recreativos ou profissionais de corrida. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura utilizando as bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (US *National Library of Medicine*), SciELO (*Scientific Electronic Library Online*) com os descritores "high intensity interval training", "injury", "running" e "runners" com suas variações. A pesquisa foi limitada com base na disponibilidade de texto (texto completo disponível), data de publicação (de janeiro de 2000 a março 2020), espécies (humanos), sem restrição de idioma. Foi permitida inclusão de qualquer modalidade de corredores (recreativos e profissionais). Foram excluídos da pesquisa os artigos que não utilizavam HIIT ou que não apresentavam relação entre treinamento e lesões. **Resultados:** Foram eleitos 32 artigos para a leitura do resumo e excluídos os que não condiziam com o propósito deste estudo. Após a leitura dos resumos, foram selecionados 7 artigos que preenchiam os critérios propostos e foram seguidos, nessa ordem, os seguintes passos: leitura exploratória; análise dos textos, finalizando com a realização de leitura interpretativa e redação. **Conclusão:** Ainda há poucos estudos que investigaram a ocorrência de lesões com a prática do treinamento intervalado de alta intensidade em corredores. Dos estudos encontrados, as amostras eram pequenas e se apresentavam em diferentes práticas de corrida como corredores de elite e recreativos.

Palavras-chave: Treinamento intervalado de alta intensidade. Corredores. Lesões na corrida.

ABSTRACT

Introduction: High intensity interval training (HIIT) is an efficient time training characterized by brief and repeated sessions of intense exercise, close to 100% of the individual's maximum capacity interspersed with rest period or low intensity exercise. It is speculated that a modality as intense as HIIT could be one of the factors to generate greater number of injuries in runners. **Objective:** To review, in the literature, studies that record injuries caused by high-intensity interval training in recreational or running professionals. **Methodology:** This is a literature review using the LILACS (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences) databases, PUBMED (National Library of Medicine and The National Institute of Health), MEDLINE (US National Library of Medicine), SciELO (Scientific Electronic Library Online) with the descriptors "high intensity interval training", "injury", "running" and "runners" with their variations. The search was limited based on the availability of text (full text available), date of publication (from January 2000 to March 2020), species (humans), without language restriction. Inclusion of any type of runners (recreational and professional) was allowed. Articles that did not use HIIT or that had no relationship between training and injuries were excluded from the research. **Results:** 32 articles were chosen to read the summary and those that did not match the purpose of this study were excluded. After reading the abstracts, 7 articles were selected that met the proposed criteria and the following steps were followed, in that order: exploratory reading; analysis of the texts, ending with the performance of interpretative reading and writing. **Conclusion:** There are still few studies that investigated the occurrence of injuries with the practice of high intensity interval training in runners. From the studies found, the samples were small and presented different samples of the different running practices as elite and recreational runners.

Keywords: High intensity interval training. Runners. Running injuries.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
2	OBJETIVOS	9
3	METODOLOGIA	10
4	RESULTADOS	11
5	DISCUSSÃO	15
6	CONCLUSÃO	19
	REFERÊNCIAS	20

1 INTRODUÇÃO

O Treino intervalado de alta intensidade ou High Intensity Interval Training (HIIT) é caracterizado por breves e repetidas sessões de exercício intenso, próximo a 100% da capacidade máxima do indivíduo intercaladas por período de repouso ou exercício de baixa intensidade (GIBALA; MCGEE, 2008; GILLEN; GIBALA, 2014). Tal modalidade promove adaptações semelhantes ao treino aeróbio de intensidade moderada (BUCCI *et al.*, 2005), sendo considerado uma intervenção tempo eficiente para melhora do condicionamento aeróbio em poucas sessões de treinamento (BURGOMASTER *et al.*, 2005; LITTLE *et al.*, 2010).

O HIIT permite a manipulação de até nove variáveis, que incluem a duração e intensidade do treino intervalado, duração e intensidade do descanso, modalidade de exercício, número de repetições, número de séries, bem como a duração e intensidade da recuperação entre séries. A manipulação de qualquer uma dessas variáveis pode afetar as respostas fisiológicas agudas ao HIIT (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013).

Não existe um padrão de tempo de duração da atividade, tempo de cada estímulos e as intensidades adequadas (SCHOENMAKERS; REED, 2019). A literatura apresenta diversos seguimentos para o HIIT: O SIT (Sprint Interval Training) que corresponde a sprints de 20 a 30 segundos intercalados por intervalos entre 2 a 4 minutos que podem ser ativos ou passivos, com esforços próximos ou superiores ao VO₂ máx., O RST (Repeated Sprint Training) que são sprints repetidos com pequenos tiros de 3 a 7 segundos de duração e separados por pequenos períodos de recuperação (menores que 60 segundos). O HIIT com intervalos curtos são estímulos com intervalos de descanso menores ou iguais a 60 segundos e com intensidade mais baixa (60% do VO₂máx.). O HIIT com intervalos longos contém intervalos acima de 60 segundos de descanso entre os estímulos (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013; MACINNIS; GIBALA, 2017).

Especula-se que uma modalidade tão intensa como o HIIT poderia ser um dos fatores para gerar um maior número de lesões em corredores. Lesões são desordens do sistema musculoesquelético ou contusões. As lesões esportivas referem-se a uma variedade de danos musculoesqueléticos relacionados a participação no esporte. Lesões são uma barreira importante para essa prática (HESPANHOL JUNIOR, L. C. et al 2015). Estudos apontam que

a incidência de lesões por ano atinge entre 40-50% dos corredores (GARCÍA-PINILLOS; SOTO-HERMOSO; LATORRE-ROMÁN, 2017; LATORRE-ROMÁN *et al.*, 2017). As lesões são multifatoriais, mas geralmente as lesões na corrida, são atribuídas ao treinamento o que pode afastar corredores do esporte e das competições (GARCÍA-PINILLOS; SOTO-HERMOSO; LATORRE-ROMÁN, 2017).

Lesões podem ser classificadas de acordo com sua magnitude (leve, média e grave), agudas ou crônicas, por uso excessivo (*overuse*), lesões recorrentes, relesão, exacerbação da lesão e podemos classificar a região da lesão. A utilização de alguns instrumentos de medição, como os questionários, auxiliam a determinar a incidência ou a prevalência de lesões (HESPANHOL JUNIOR *et al.*, 2015). Ainda, lesões causadas por *overuse* correspondem a aproximadamente 49% das lesões musculoesqueléticas, enquanto, as lesões agudas cerca de 13% e outras patologias cerca de 36% (CLARSEN *et al.*, 2014).

Clarsen B. *et al.* (2014) em seu estudo com atletas olímpicos e paraolímpicos de diferentes esportes, encontrou que lesões causadas por *overuse* correspondem a aproximadamente 49% das lesões musculoesqueléticas, enquanto, as lesões agudas cerca de 13% e outras patologias cerca de 36% (CLARSEN, B. *et al.* 2014).

A carga de treinamento mais elevada, manipulando a intensidade, duração e frequência de treinamento, proporciona adaptações cardiovasculares e neuromusculares positivas, porém, se essas variáveis forem acima do que o sistema tolera, lesões podem ocorrer (BUCCI *et al.*, 2005).

Diante do exposto e com o aumento da prática do HIIT nos treinos de corredores e o possível aumento de lesões que pode estar relacionado, essa revisão de literatura justifica-se pela necessidade de explorar o que a literatura atual traz sobre os riscos e benefícios dessa modalidade de treinamento quanto à presença de lesões em corredores para que possa ser traçado estratégias no treinamento de corredores.

2 OBJETIVOS

- Revisar, na literatura, estudos que registram lesões provocadas pelo treinamento intervalado de alta intensidade em praticantes recreativos ou profissionais de corrida;
- Elucidar possíveis mecanismos de lesão provocados pelo HIIT em corredores.

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão da literatura utilizando as bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (US *National Library of Medicine*), SciELO (*Scientific Electronic Library Online*)<https://bjsm.bmj.com/>.

Os descritores utilizados foram "high intensity interval training", "injury", "running" e "runners" com suas variações. A pesquisa foi limitada com base na disponibilidade de texto (texto completo disponível), data de publicação (de janeiro de 2000 a março 2020), espécies (humanos), sem restrição de idioma. Foi permitida inclusão de qualquer modalidade de corredores (recreativos e profissionais). Foram excluídos da pesquisa os artigos que não utilizavam HIIT ou que não apresentavam relação entre treinamento e lesões.

4 RESULTADOS

Foram eleitos 32 artigos para a leitura do resumo e excluídos os que não condiziam com o propósito deste estudo. Após a leitura dos resumos, foram selecionados 7 artigos que preenchiam os critérios propostos e foram seguidos, nessa ordem, os seguintes passos: leitura exploratória; análise dos textos, finalizando com a realização de leitura interpretativa e redação.

A partir da análise dos textos, foi elaborada a tabela abaixo (tabela 1) que expõe os autores, amostra, objetivo, intervenção e resultados nos artigos selecionados com o objetivo de sistematizar e facilitar a comparação entre as abordagens das diversas fontes.

Tabela 1. Análise descritiva dos estudos incluídos

AUTORES	AMOSTRA	OBJETIVO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
GARCÍA-PINILLOS <i>et al.</i> 2016	Estudo observacional com 18 adolescentes treinados, sendo 16 homens e 2 mulheres com idade de 30.9 ± 11.7 anos.	Avaliar as características cinemáticas da corrida durante os estágios inicial e final de dois protocolos de HIIT com carga externa semelhante, mas com ritmo médio de corrida diferente, bem como comparar as alterações induzidas pela fadiga durante os dois HIIT.	Cada atleta foi testado em 2 ocasiões separadas por 7 dias: 1- 10 corridas de 400 m com 90-120s de recuperação entre corridas 2- 40 corridas de 100 m com 25-30s de recuperação entre corridas.	Constataram que a intensidade acima da velocidade associada ao VO ₂ máx não perturba consistentemente a cinemática da corrida de corredores treinados.
GARCÍA-PINILLOS <i>et al.</i> 2016	Estudo observacional com 28 corredores de resistência do sexo masculino com idade média de 27 ± 7 anos.	Avaliar as características cinemáticas da corrida durante os estágios inicial e final que ocorrem durante uma sessão comum de HIIT para corredores de endurance.	Foram realizadas duas análises de cluster, de acordo com o ritmo médio de corrida - mais rápido x mais lento, e de acordo com o nível de exaustão atingido - grupo esgotado x não esgotado.	Uma sessão HIIT comum para corredores de endurance não perturba significativamente a cinemática da corrida de corredores masculinos treinados. A maioria das lesões na corrida pode ser atribuída ao uso excessivo de repetidos períodos de atividade.
KOHN <i>et al.</i> 2011	Estudo experimental com 18 corredores de endurance treinados.	Investigar as adaptações fisiológicas e musculoesqueléticas em corredores de endurance submetidos a 6 semanas de HIIT.	Realizados o protocolo de HIIT 2 vezes por semana, durante 6 semanas.	O HIIT no treinamento de resistência com corredores não causou adaptações na capacidade oxidativa do músculo, mas aumentou a atividade do metabolismo do lactato, especialmente nas fibras tipo IIa e a relação com a velocidade absoluta no HIIT. Seis semanas de HIIT provocou melhorias no desempenho e aumento do metabolismo de lactato.

LATORRE- ROMÁN <i>et al.</i> 2016	Estudo experimental com 13 atletas saudáveis, de elite e altamente treinados, do sexo masculino com idade média de $30,83 \pm 7,82$ anos.	Avaliar as características cinemáticas da corrida e os padrões de pisada durante os estágios iniciais e finais do treinamento intermitente de alta intensidade real e comum (HIIT): 5×2000 m com recuperação de 120 s entre as corridas.	Os participantes realizaram 5 corridas de 2000 m com 120 s de recuperação entre as sessões de corrida (5×2000 m).	O estudo não encontrou alterações nas características cinemáticas e nos padrões de pisada em corredores de resistência após fadiga induzida por um HIIT, indicando que treinadores e corredores não devem temer efeitos prejudiciais consideráveis do HIIT na cinemática da corrida e no padrão de pisada e, portanto, na técnica de corrida.
MUJKA <i>et al.</i> 2000	Estudo experimental com 8 corredores masculinos de média distância, bem treinados, com idade média de $19,9 \pm 1,8$ anos	Examinar respostas fisiológicas e de desempenho de um cone 6-d, e a influência da intensidade e volume do treinamento nessas respostas.	Os participantes realizaram um dos dois possíveis programas experimentais de redução que consistia em 3 semanas de treinamento de sobrecarga e 1 semana de treinamento de recuperação.	Alterações fisiológicas induzidas por concidência em corredores de média distância são principalmente hematológicas, e mudanças fisiológicas distintas são provocadas pelo LICT (treinamento contínuo de baixa intensidade) e HIIT durante o afunilamento.
SANTOS- CONCEJERO <i>et al.</i> 2017	Estudo experimental com 15 corredores de elite quenianos da tribo Kalenjin com média de idade de 23.7 ± 4.2 .	Analisar a resposta da oxigenação cerebral durante o treinamento intervalado de alta intensidade e sua relação com o desempenho na corrida	Foram 3 testes em 3 dias consecutivos. 1- 5km; 2- um teste máximo de VO2 máx.; 3- um teste de treino fatigante	Demonstrou declínio na oxigenação cerebral durante uma sessão típica e fatigante do HIIT. Os atletas mais bem-sucedidos foram capazes de suportar quedas maiores na oxigenação cerebral.
SCHOENMAKE <i>et al.</i> 2018	Estudo experimental com 12 corredores recreacionais treinados do sexo masculino com idade média de 34 ± 11 anos.	Examinar os efeitos de diferentes durações de recuperação nas velocidades de corrida, além das respostas fisiológicas e classificações de	Os participantes realizaram uma sessão HIIT compreendendo seis intervalos de trabalho de 4 minutos, nos quais a duração da recuperação entre os intervalos de	As respostas da percepção de esforço foram semelhantes entre os protocolos, mostrando um aumento gradual a cada intervalo progressivo do treinamento. No entanto, as velocidades de corrida foram maiores quando os participantes receberam o maior período de recuperação (3min).

		esforço percebido (EPR) em um protocolo de treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) comumente utilizado.	trabalho era igual a uma duração fixa (1MIN, 2MIN, 3MIN) ou uma duração auto selecionada (ssMIN).	
--	--	--	---	--

5 DISCUSSÃO

Este trabalho promoveu uma revisão na literatura em busca de estudos que abordavam os mecanismos que poderiam atrapalhar o desempenho de corredores provocados pelo treinamento intervalado de alta intensidade em praticantes de corrida, e então poder discutir sobre os possíveis mecanismos que levariam a tais lesões. Foram localizados poucos estudos que se adequavam a proposta do trabalho; e ainda apresentavam amostra reduzida o que reduz a qualidade dos estudos e não permite respostas conclusivas sobre o tema.

O aumento de lactato muscular e a diminuição das reservas de fosfato levam a fadiga muscular e parecem estar associados a mudanças em alguns padrões de movimento, ocasionando movimentos inadequados que costumam estar associados ao aumento no risco do aparecimento de algumas lesões encontradas na corrida (GARCÍA-PINILLOS *et al.*, 2019). A fadiga muscular pode causar alteração biomecânica e neuromuscular, levando ao desequilíbrio muscular e consequentemente instabilidade articular, além de prejuízos no desempenho da prática esportiva (LATORRE-ROMÁN *et al.*, 2017). A corrida com intensidade mais elevada, requer ativação de mais unidades motoras e maior recrutamento de fibras musculares oxidativas e glicolíticas, além disso, o aumento no metabolismo muscular inibe a atividade de certas enzimas como as ATPases, bomba de sódio e potássio, cálcio e miosinas, interferindo na contração muscular. O aumento da velocidade, leva ao maior impacto articular nos membros inferiores e maior comprometimento neuromuscular, principalmente dos isquiotibiais (GARCÍA-PINILLOS; SOTO-HERMOSO; LATORRE-ROMÁN, 2016; LATORRE-ROMÁN *et al.*, 2017).

Porém um estudo analisou que uma sessão de HIIT com corredores de endurance não perturba consistentemente ou substancialmente a cinemática da corrida de corredores treinados do sexo masculino. Além disso, nem o desempenho atlético nem o nível de exaustão atingido parecem ser determinantes na resposta cinemática durante um treino de HIIT (GARCÍA-PINILLOS; SOTO-HERMOSO; LATORRE-ROMÁN, 2016). Corroborando com outro artigo do mesmo autor que constatou que a maior intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio não perturba a cinemática da corrida de corredores de resistência treinados (GARCÍA-PINILLOS *et al.*, 2019). Tais achados são

evidenciados por outro estudo que comparou treze atletas de elite altamente treinados, e avaliou as condições fatigadas e não fatigadas no início e no final do protocolo respectivamente, e concluiu que não houve alterações nas características cinemáticas e dos padrões de pisada (LATORRE-ROMÁN *et al.*, 2017).

O risco de lesão pode também estar associado à natureza repetitiva da corrida e às forças de reação do solo causadas pelo impacto durante a corrida e o intervalo de descanso ativo ou passivo entre os tiros no treinamento com o HIIT reduziriam essa fadiga ao permitir um menor desgaste muscular (LATORRE-ROMÁN *et al.*, 2017). O tempo de recuperação pode ser uma estratégia interessante, pois durações de recuperação mais longas podem facilitar uma carga de treinamento externa mais alta (velocidade de corrida) enquanto mantem uma carga interna semelhante (estímulo fisiológico) nas sessões HIIT e, portanto, podem permitir maiores adaptações de treinamento reduzindo lesões. Intervalo de recuperação mais longo (3 min) entre esforços, facilita uma velocidade de corrida mais rápida, o que é particularmente importante quando o foco da sessão é o trabalho de velocidade (SCHOENMAKERS; REED, 2019).

Grande parte das lesões na corrida são atribuídas ao overuse (GARCÍA-PINILLOS *et al.*, 2019; GARCÍA-PINILLOS; SOTO-HERMOSO; LATORRE-ROMÁN, 2016) porém são necessárias mais evidências sobre os efeitos cumulativos utilizando HIIT nas sessões do treino de corrida (LATORRE-ROMÁN *et al.*, 2017). Lesões podem estar relacionadas a cargas de treinamento elevadas, por isso, a manipulação correta da intensidade, duração e frequência do treinamento são importantes para que ocorra as adaptações cardiovasculares e neuromusculares desejadas com segurança (OWEN *et al.*, 2015). Visto que já é sabido que lesões por uso excessivo representam 49% de problemas para os atletas (CLARSEN *et al.*, 2014). Ainda, corredores de média distância podem reduzir progressivamente o volume habitual de treinamento em pelo menos 75% que não apresentarão sinais de destreinamento (MUJICA *et al.*, 2000).

Outro fator que podemos considerar, foi exposto no estudo que analisou 15 corredores quenianos de elite para entender a resposta da oxigenação cerebral durante o treinamento intervalado de alta intensidade e sua relação com o desempenho na corrida, concluiu-se que os atletas não oxigenam tão bem quando forçados a exercer seus limites

fisiológicos podendo diminuir seu rendimento e se predispor a lesões (SANTOS-CONCEJERO *et al.*, 2017).

O treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) induz adaptações metabólicas e de desempenho do músculo esquelético que se assemelham ao treinamento de resistência tradicional, apesar de um baixo volume total de exercícios (LITTLE *et al.*, 2010). É recomendado que o HIIT e a corrida contínua (CR) façam parte de programas de treinamento para corredores de resistência maximizando assim as adaptações ao treinamento. Além disso, 2 a 3 sessões de HIIT, trabalhando próximo ou acima do VO₂máx na sessão, permitem melhora do desempenho em corredores de endurance. Uma boa prática utilizando o HIIT para treinamento dos corredores de resistência incluiria protocolos envolvendo curtos períodos de trabalho (<1 min.) com relações entre trabalho e descanso de aproximadamente 1: 1 a 1: 2, sendo executados com intensidades próximo a 100% do VO₂máx. A carga de trabalho baseada no HIIT varia de acordo com a periodização do treinamento, que deve basear-se no princípio progressivo de sobrecarga (GARCÍA-PINILLOS; SOTO-HERMOSO; LATORRE-ROMÁN, 2017). Treinadores devem programar uma periodização adequada, levando em consideração tanto a intensidade quanto o volume dos treinos e que treinamentos com duração longa devem ser evitados (OWEN *et al.*, 2015).

A implementação de medidas preventivas implica uma mudança ou modificação do comportamento do atleta e, na maioria dos casos, de outros envolvidos nos cuidados e contexto próximos ao atleta, como por exemplo, o treinador (VERHAGEN; VAN NASSAU, 2019). A principal dificuldade dos treinadores e atletas é administrar a relação de carga e volume absoluto de treinamento, e a possibilidade de modificar algumas variáveis sem que haja impacto fisiológico e neuromuscular de forma perigosa para o atleta (GARCÍA-PINILLOS *et al.*, 2019).

Durante a pré-temporada ocorrem mais lesões se comparados a outras temporadas (LITTLE *et al.*, 2010). Isso acontece, devido ao aumento da intensidade e do volume de treinamento. Sendo necessário que os profissionais que cercam o atleta, escolham qual é a melhor forma e mais segura de se treinar para atingir a melhor performance e correndo menos risco de lesões (OWEN *et al.*, 2015). Algumas estratégias podem ser utilizadas para auxiliar na forma mais segura e eficiente de controlar essa intensidade e o volume, como por exemplo as zonas de treino para controle do sistema cardíaco, o GPS (Sistema

de posicionamento global), alguns questionários e o próprio relato dos atletas (OWEN *et al.*, 2015). Para determinar a gravidade das lesões, podemos analisar: a natureza da lesão, duração, atenção médica, tempo afastado da atividade ou do esporte, tempo afastado do trabalho, dano permanente e o custo da lesão (HESPANHOL JUNIOR *et al.*, 2015). Ao utilizar sistemas de monitoramento confiáveis e aplicar de maneira contínua e a longo prazo, será possível identificar o ônus das lesões, identificar os possíveis casos em um estágio inicial, implementar intervenções precoces e gerar dados para prevenção de lesões esportivas, sendo a implementação de sistemas de monitoramento de lesões esportivas fortemente recomendada (HESPANHOL JUNIOR *et al.*, 2015).

É importante implementar medidas preventivas, que impliquem em mudanças ou modificações no corredor e no caso dos corredores profissionais deve-se incluir os envolvidos com esses atletas, como o técnico e sua comissão (VERHAGEN; VAN NASSAU, 2019). As lesões podem ser uma barreira para essa prática, podendo gerar custos e atraso na volta ao esporte o que torna importante encontrar formas de preveni-las (HESPANHOL JUNIOR *et al.*, 2015).

6 CONCLUSÃO

Estudos apontam que o treinamento intervalado de alta intensidade em corredores pode ser considerado uma intervenção tempo eficiente para melhora do condicionamento aeróbio em poucas sessões de treinamento. Dos trabalhos até o momento não foi visto uma relação entre HIIT x Lesões consistente, que determinem alterações na resposta cinemática da corrida podendo causar algum prejuízo aos corredores, mas outros estudos mais criteriosos devem ser feitos.

Ainda há poucos estudos que investigaram a ocorrência de lesões com a prática do treinamento intervalado de alta intensidade em corredores. Dos estudos encontrados, as amostras eram pequenas e apresentavam amostras diversas das diferentes práticas de corrida como corredores de elite e recreativos.

Novos estudos com maior rigor metodológico devem ser realizados para uma melhor investigação do risco de lesões na prática do HIIT em corredores. Algo que deve ser notado é a grande variação de protocolos de HIIT encontrados nos estudos. Porém vale destacar que esta modalidade de treinamento apresenta estrutura com períodos de repouso ativo ou passivo entre os tiros, volume menor de treinamento e sua determinação de intensidade é baseada nos próprios parâmetros do indivíduo fazendo com que o risco de lesões possa ser reduzido.

REFERÊNCIAS

- BUCCI, Marco *et al.* Efeitos do treinamento concomitante hipertrofia e endurance no músculo esquelético. **Rev. bras. ciênc. mov**, v. 13, n. 1, p. 17–28, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.18511/rbcm.v13i1.608>. Acesso em: 8 jun. 2020.
- BUCHHEIT, Martin; LAURSEN, Paul B. High-Intensity Interval Training, Solutions to the Programming Puzzle. **Sports Medicine**, v. 43, n. 5, p. 313–338, 29 maio 2013. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s40279-013-0029-x>. Acesso em: 8 jun. 2020.
- BURGOMASTER, Kirsten A. *et al.* Six sessions of sprint interval training increases muscle oxidative potential and cycle endurance capacity in humans. **Journal of Applied Physiology**, v. 98, n. 6, p. 1985–1990, jun. 2005. Disponível em: <https://www.physiology.org/doi/10.1152/jappphysiol.01095.2004>. Acesso em: 8 jun. 2020.
- CLARSEN, Benjamin *et al.* The Oslo Sports Trauma Research Center questionnaire on health problems: a new approach to prospective monitoring of illness and injury in elite athletes. **British Journal of Sports Medicine**, v. 48, n. 9, p. 754–760, maio 2014. Disponível em: <http://bjsm.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bjsports-2012-092087>. Acesso em: 8 jun. 2020.
- GARCÍA-PINILLOS, Felipe *et al.* Kinematic alterations after two high-intensity intermittent training protocols in endurance runners. **Journal of Sport and Health Science**, v. 8, n. 5, p. 442–449, set. 2019. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2095254616301004>. Acesso em: 8 jun. 2020.
- GARCÍA-PINILLOS, Felipe; SOTO-HERMOSO, Víctor M.; LATORRE-ROMÁN, Pedro A. How does high-intensity intermittent training affect recreational endurance runners? Acute and chronic adaptations: A systematic review. **Journal of Sport and Health Science**, v. 6, n. 1, p. 54–67, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jshs.2016.08.010>. Acesso em: 8 jun. 2020.
- GARCÍA-PINILLOS, Felipe; SOTO-HERMOSO, Víctor M.; LATORRE-ROMÁN, Pedro Á. Do Running Kinematic Characteristics Change over a Typical HIIT for Endurance Runners? **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 30, n. 10, p. 2907–2917, out. 2016. Disponível em: <http://journals.lww.com/00124278-201610000-00029>. Acesso em: 8 jun. 2020.
- GIBALA, Martin J.; MCGEE, Sean L. Metabolic Adaptations to Short-term High-Intensity Interval Training. **Exercise and Sport Sciences Reviews**, v. 36, n. 2, p. 58–63, abr. 2008. Disponível em: <http://journals.lww.com/00003677-200804000-00003>. Acesso em: 8 jun. 2020.
- GILLEN, Jenna B.; GIBALA, Martin J. Is high-intensity interval training a time-efficient exercise strategy to improve health and fitness? **Applied Physiology, Nutrition, and**

Metabolism, v. 39, n. 3, p. 409–412, mar. 2014. Disponível em: <http://www.nrcresearchpress.com/doi/10.1139/apnm-2013-0187>. Acesso em: 8 jun. 2020.

HESPANHOL JUNIOR, Luiz C. *et al.* Measuring sports injuries on the pitch: a guide to use in practice. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 19, n. 5, p. 369–380, out. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-35552015000500369&lng=en&nrm=iso&tlng=en. Acesso em: 8 jun. 2020.

KOHN, T. A. *et al.* Specific muscle adaptations in type II fibers after high-intensity interval training of well-trained runners. **Scand J Med Sci Sports** v.21, p.765–772, 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20492589>. Acesso em: 8 jun. 2020.

LATORRE-ROMÁN, P. Á. *et al.* Acute effects of high-intensity intermittent training on kinematics and foot strike patterns in endurance runners. **Journal of Sports Sciences**, v. 35, n. 13, p. 1247–1254, 3 jul. 2016. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2016.1218038>. Acesso em: 8 jun. 2020.

LITTLE, Jonathan P. *et al.* A practical model of low-volume high-intensity interval training induces mitochondrial biogenesis in human skeletal muscle: potential mechanisms. **The Journal of Physiology**, v. 588, n. 6, p. 1011–1022, 15 mar. 2010. Disponível em: <http://doi.wiley.com/10.1113/jphysiol.2009.181743>. Acesso em: 8 jun. 2020.

MACINNIS, Martin J.; GIBALA, Martin J. Physiological adaptations to interval training and the role of exercise intensity. **The Journal of Physiology**, v. 595, n. 9, p. 2915–2930, 1 maio 2017. Disponível em: <http://doi.wiley.com/10.1113/JP273196>. Acesso em: 8 jun. 2020.

MUJIKÁ, Iñigo *et al.* Physiological responses to a 6-d taper in middle-distance runners: Influence of training intensity and volume. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, v. 32, n. 2, p. 511–517, 2000. Disponível em: https://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2000/02000/Physiological_responses_to_a_6_d_taper_in.38.aspx. Acesso em: 8 jun. 2020.

OWEN, Adam L. *et al.* Heart Rate–Based Training Intensity and Its Impact on Injury Incidence Among Elite-Level Professional Soccer Players. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 29, n. 6, p. 1705–1712, jun. 2015. Disponível em: <http://journals.lww.com/00124278-201506000-00032>. Acesso em: 8 jun. 2020.

SANTOS-CONCEJERO, Jordan *et al.* Brain oxygenation declines in elite Kenyan runners during a maximal interval training session. **European Journal of Applied Physiology**, v. 117, n. 5, p. 1017–1024, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28321639/>. Acesso em: 8 jun. 2020.

SCHOENMAKERS, Patrick P.J.M.; REED, Kate E. The effects of recovery duration on physiological and perceptual responses of trained runners during four self-paced HIIT sessions. **Journal of Science and Medicine in Sport**, v. 22, n. 4, p. 462–466, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2018.09.230>. Acesso em: 8 jun. 2020.

VERHAGEN, Evert; VAN NASSAU, Femke. Implementation science to reduce the prevalence and burden of MSK disorders following sport and exercise-related injury. **Best Practice & Research Clinical Rheumatology**, v. 33, n. 1, p. 188–201, fev. 2019. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1521694219300336>. Acesso em: 8 jun. 2020.