UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas

Programa de Pós-graduação em Matemática

Julio Cesar Lanazca Vargas

**O comportamento limite de soluções para problemas de
Dirichlet envolvendo o p -Laplaciano com termos de
convecção e de crescimento exponencial**

Belo Horizonte

2024

Julio Cesar Lanazca Vargas

O comportamento limite de soluções para problemas de Dirichlet envolvendo o p -Laplaciano com termos de convecção e de crescimento exponencial

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Matemática.

Orientador: Prof. Dr. Grey Ercole

Coorientador: Prof. Dr. Anderson Luís Albuquerque de Araujo

Belo Horizonte

2024

Lanazca Vargas, Julio Cesar.

L243c O comportamento limite de soluções para problemas de Dirichlet envolvendo o p -Laplaciano com termos de convecção e de crescimento exponencial [recurso eletrônico] / Julio Cesar Lanazca Vargas. Belo Horizonte — 2024.

1 recurso online (70 f. il.): pdf.

Orientador: Grey Ercole.

Coorientador: Anderson Luís Albuquerque de Araújo.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática.

Referências: f. 64-66

1. Matemática – Teses. 2. Comportamento assintótico – Teses. 3. Operador laplaciano – Teses. 4. Dirichlet, Problemas de – Teses. I. Ercole, Grey. II. Araújo, Anderson Luís Albuquerque de III. Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática. IV. Título.

CDU 51(043)

FOLHA DE APROVAÇÃO

O comportamento limite de soluções para problemas de Dirichlet envolvendo o p -Laplaciano com termos de convecção e de crescimento exponencial

JULIO CESAR LANAZCA VARGAS

Tese defendida e aprovada pela banca examinadora constituída por:

Documento assinado digitalmente
GREY ERCOLE
Data: 09/09/2024 15:57:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Grey Ercole
Orientador - UFMG

Documento assinado digitalmente
ANDERSON LUIS ALBUQUERQUE DE ARAUJO
Data: 10/09/2024 21:55:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Anderson Luís Albuquerque de Araújo
Coorientador - UFV

Documento assinado digitalmente
HAMILTON PRADO BUENO
Data: 10/09/2024 17:24:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Hamilton Prado Bueno
UFMG

Documento assinado digitalmente
LUCAS CATAO DE FREITAS FERREIRA
Data: 10/09/2024 14:24:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Lucas Catão de Freitas Ferreira
UNICAMP

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA FARIA
Data: 10/09/2024 15:51:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Luiz Fernando de Oliveira Faria
UFJF

Documento assinado digitalmente
OLIMPIO HIROSHI MIYAGAKI
Data: 10/09/2024 06:42:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Olímpio Hiroshi Miyagaki
UFSCar

Documento assinado digitalmente
RONALDO BRASILEIRO ASSUNCAO
Data: 10/09/2024 19:02:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof. Ronaldo Brasileiro Assunção
UFMG

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2024.

Agradecimentos

Agradeço primeiramente à minha família, que é a base sobre a qual me sustento. Em especial, à minha mãe, Aurea Vargas, pelo exemplo de perseverança. Agradeço às minhas irmãs Blanca, Mercedes, Nátaly e ao meu sobrinho Fabián, pelo apoio, compreensão e carinho. Sou grato a todos eles, pois não teria conseguido concluir esta fase sem o amor deles.

À dona Jurema Yara Bento, por ter me acolhido com tanto carinho e por ter tirado “as pedras do caminho”. Obrigado, dona Jurema.

Ao meu orientador, Grey Ercole, pela paciência, aprendizado valioso e pela dedicação ao longo destes anos. Ao meu coorientador, Anderson Araujo, pelo conhecimento, motivação e compreensão.

Agradeço em especial à Fernanda, pelos cafés no corredor, pelas conversas na sala e pela “hora da bala”. Também agradeço pela amizade à Alejandra, Adam, Isadora, Maíra, Marco, por estarem presentes no percurso do doutorado.

Agradeço aos meus amigos de Juiz de Fora, Edyenis, Wilian, Sarah, Eli, Mariana e Edneia, por sempre estarem na torcida.

Agradeço à Mary Zaravia e à Raquel Schmidt, pela companhia, pelo carinho e pelos momentos de força.

Agradeço à turbulência no avião, que me fez conhecer a Érica Vieira. Obrigado pela amizade, Érica.

Agradeço também a todos os professores da pós-graduação e à Andréa e à Kelli, pela dedicação e disposição de sempre. Por fim, agradeço à UFMG pela oportunidade e ao CNPq pelo suporte financeiro.

"Aqui é galo doido".

Fernanda Baêta

Resumo

O objetivo principal deste trabalho é determinar o comportamento assintótico, quando $p \rightarrow \infty$, de soluções de problemas de Dirichlet para o p -Laplaciano em que a não-linearidade combina um termo de convecção com um termo exponencial.

Estudamos o problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda u^{q-1} + \beta u^{a-1} |\nabla u|^b + m u^{l-1} e^{\alpha u^s} & \text{em } \Omega, \\ u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P)$$

em que Ω é um domínio suave e limitado de $\mathbb{R}^N$, com $N \geq 2$, e $\Delta_p u := \operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u)$ é o operador p -Laplaciano, $p > 1$. Os parâmetros λ, β e m são não negativos, e os expoentes q, a, b, l, α e s satisfazem certas condições, entre as quais $1 < q < p$.

Motivados pelo trabalho de Bueno e Ercole [9], provamos um resultado de existência de soluções para o problema (P) que complementa trabalhos de: de Figueiredo, Gossez, Quoirin e Ubilla [21], de Araujo e Montenegro [15] e de Araujo e Faria [13].

Em seguida, para λ e β arbitrariamente fixados e para m suficientemente pequeno, provamos que as soluções obtidas convergem uniformemente para d_Ω , a função distância até a fronteira, quando $p \rightarrow \infty$.

Palavras-chave: comportamento assintótico; p -Laplaciano; termo de convecção.

Abstract

The main purpose of this work is to determine the asymptotic behavior, as $p \rightarrow \infty$, of solutions to a Dirichlet p -Laplacian problem in which the nonlinearity combines a convection term with an exponential term.

We study the Dirichlet problem

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda u^{q-1} + \beta u^{a-1} |\nabla u|^b + m u^{l-1} e^{\alpha u^s} & \text{in } \Omega, \\ u > 0 & \text{in } \Omega, \\ u = 0 & \text{on } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P)$$

where Ω is a bounded, smooth domain of $\mathbb{R}^N$, with $N \geq 2$, and $\Delta_p u := \operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u)$ is the p -Laplacian operator, $p > 1$. The parameters λ, β e m are nonnegative and the exponents q, a, b, l, α and s satisfy certain conditions, among them $1 < q < p$.

Motivated by Bueno and Ercole [9], we first prove an existence result of solutions to the problem (P) which complements works by: de Figueiredo, Gossez, Quoirin and Ubilla [21], de Araujo and Montenegro [15] and de Araujo and Faria [13].

In the sequence, for arbitrarily fixed λ and β , and for sufficiently small m , we prove that the obtained solutions converge uniformly to d_Ω , the distance function to the boundary, as $p \rightarrow \infty$.

Keywords: asymptotic behavior; p -Laplacian; convection term.

Sumário

Introdução	10
1 Preliminares	16
1.1 A função distância até a fronteira	16
1.2 O operador p -Laplaciano	17
1.3 O problema de autovalor do p -Laplaciano	17
1.4 O primeiro autovalor do p -Laplaciano	18
1.5 O problema de Torção	19
1.6 O espaço de Lorentz	19
1.7 O espaço de Lorentz-Sobolev	24
2 Existência de soluções do problema de Dirichlet com termos de con- vecção e de crescimento exponencial	25
2.1 Definições e resultados preliminares	26
2.2 Prova do resultado principal	30
2.3 Aplicações do resultado principal	35
2.3.1 Aplicação 1	35
2.3.2 Aplicação 2	37
2.3.3 Aplicação 3	39
2.3.4 Aplicação 4	40
3 Um resultado de não existência	42
4 Comportamento assintótico	46
4.1 Resultados de convergência e estimativas	46
4.2 Convergência uniforme para d_Ω	53

5	Comportamento limite de soluções do problema de Dirichlet envolvendo o p -Laplaciano e um termo de convecção com expoente dependendo de p	59
5.1	Estimativas assintóticas	60
5.2	A convergência uniforme para d_Ω	63
	Referências	66
A	Espaço de Sobolev	71
B	Desigualdade de Hölder	73
C	Princípio de Comparação	75
D	Método de sub-supersolução	76
E	Unicidade de soluções positivas para certas equações elípticas quase lineares	78
F	Imersões Compactas	80
G	Teorema do Ponto fixo de Schauder	81

Introdução

Este trabalho é dedicado ao estudo de um problema quasilinear elítico envolvendo um termo de convecção e um termo exponencial. Mais precisamente, estudamos a existência e o comportamento limite, quando p tende ao infinito, das soluções do problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda u^{q-1} + \beta u^{a-1} |\nabla u|^b + m u^{l-1} e^{\alpha u^s} & \text{em } \Omega, \\ u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P)$$

em que Ω é um domínio suave e limitado de $\mathbb{R}^N$ ($N \geq 2$) e $\Delta_p u := \operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u)$ é o operador p -Laplaciano, $p > 1$ (observe que para $p = 2$, é exatamente o operador Laplaciano). Os parâmetros λ , β e m , são não negativos e as constantes q, a, b, l, α e s satisfazem

$$a, l \geq 1, \quad b > 0, \quad s, \alpha \geq 0, \quad \text{e } p > q \geq 1.$$

Entende-se o problema (P) no sentido fraco, isto é, $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ é solução de (P) se, e somente se,

$$\int_{\Omega} |\nabla u_p|^{p-2} \nabla u_p \nabla v \, dx = \int_{\Omega} \left(\lambda u_p^{q-1} + \beta u_p^{a-1} |\nabla u_p|^b + m u_p^{l-1} e^{\alpha u_p^s} \right) v \, dx, \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega).^1$$

Quanto ao comportamento limite, nosso principal objetivo é mostrar que, sob determinadas condições, as soluções u_p convergem uniformemente para d_{Ω} , a função distância até a fronteira, quando p tende ao infinito, em que

$$d_{\Omega}(x) := \min_{y \in \partial\Omega} |x - y|, \quad x \in \overline{\Omega}.$$

¹ $W_0^{1,p}(\Omega)$ é o fecho de $C_0^{\infty}(\Omega)$ em $W^{1,p}(\Omega)$.

Nas últimas décadas, este tipo de comportamento limite das soluções do problema de Dirichlet da forma

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(\phi_p(|\nabla u|)\nabla u) = f(x, u) & \text{em } \Omega, \\ u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases}$$

foi obtido por muitos autores. Podemos nos referir a [5], [27], [31] para o p -Laplaciano, isto é, para o caso quando $\phi_p(t) = t^{p-2}$, e para o caso de funções ϕ_p mais gerais, podemos nos referir [7], [19], [20], [22], [23], [25]. Em todos estes trabalhos os autores encontraram a função distância até a fronteira como o limite uniforme das soluções u_p , quando p tende ao infinito. No entanto, até onde sabemos, este é o primeiro trabalho em que o comportamento assintótico, quando $p \rightarrow \infty$, é estudado para uma p -família de problemas de Dirichlet com termos de convecção (ou seja, gradiente na não linearidade).

No Capítulo 1, apresentamos algumas definições que serão utilizadas nos capítulos seguintes: Problema do Primeiro Autovalor do p -Laplaciano, problema de Torção, entre outros. Também são apresentados resultados de convergência (ver Lema 1.4.1, Teorema 1.5.1), os quais são fundamentais para obter a convergência uniforme da família de soluções (u_p).

No Capítulo 2, provamos a existência de uma solução do problema (P) (Teorema 2.0.1). Enfatizamos que este resultado de existência não impõe restrição alguma nem no expoente s no termo exponencial, nem no expoente b no termo de convecção; respectivamente ao valor crítico $\frac{N}{N-1}$ (desigualdade de Trudinger Moser) e ao expoente crítico p (o crescimento natural do gradiente). A prova deste teorema, apresentada na Seção 2.2, é inspirada por uma abordagem introduzida por Bueno e Ercole em [9], a qual combina o método de sub-supersolução com uma versão do Teorema do Ponto Fixo de Schauder.

Em [21], de Figueiredo, Gossez, Quoirin e Ubilla provaram resultados de existência

para as seguintes classes de problemas envolvendo o p -Laplaciano e um termo de convecção

$$\begin{cases} -\Delta_p u = g(u) |\nabla u|^p + f(x, u) & \text{em } \Omega, \\ u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases}$$

Estes resultados se aplicam às seguintes não linearidades particulades (na nossa notação), em que $p^* = \frac{Np}{N-p}$ denota o bem conhecido expoente crítico de Sobolev:

- (a) $\beta |\nabla u|^p + u^{l-1} e^{\alpha u}$, com $\beta > 0$, $l > p$ e $0 < \alpha < \beta \frac{p^*-p}{p-1}$ ([21, Exemplo 2.3]);
- (b) $u^{a-1} |\nabla u|^p + mu^{p-1} e^{\alpha u^a}$, com $a > 1$, $0 < \alpha < \frac{p^*-p}{(p-1)a}$ e $0 < m < \lambda_p$ ([21, Exemplo 2.9]);
- (c) $\beta |\nabla u|^p + u^{l-1}$, com $\beta > 0$ e $l > p$ ([21, Exemplo 2.13]); e
- (d) $\beta |\nabla u|^p + mu^{l-1} e^{\alpha u}$, com $\beta > 0$, $0 < \alpha < \beta \frac{p^*-p}{p-1}$, $1 \leq l < p$ e m positivo, suficientemente pequeno ([21, Teorema 2.17]).

Nosso Teorema 2.0.1 complementa resultados de existência para essas não linearidades particulares, com um termo sublinear adicional λu^{q-1} ($1 \leq q < p$) e com $|\nabla u|^b$ ($b > 0$) no lugar de $|\nabla u|^p$. De fato, os itens (a) e (c) são complementados pelo Corolário 2.3.3, o item (b) é complementado pelo Corolário 2.3.4, e o item (d) é complementado pelo Corolário 2.3.1.

Em [15], Araujo e Montenegro consideraram o seguinte problema de Dirichlet (na nossa notação)

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda u^{q-1} + u^{l-1} e^{\alpha u^s} & \text{em } \Omega, \\ u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

em que $1 < q < p$, $l \geq 1$ e $s > 0$. Usando uma abordagem introduzida em [9], eles provaram um resultado de existência para λ e α suficientemente pequenos, assumindo $l \neq p$. Além de incluir um termo de convecção, nosso Teorema 2.0.1 complementa o Teorema 1.1 de [15].

Ainda neste capítulo, na Seção 2.3 apresentamos mais duas aplicações do Teorema 2.0.1 (ver Corolário 2.3.2 e 2.3.3), que estendem um recente resultado de existência ob-

tido por Araujo e Faria em [13].

No Capítulo 3, provamos, como consequência da desigualdade de Picone, um resultado de não existência para o problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p u = mu^{l-1}e^{\alpha u^s} + g(x) & \text{em } \Omega, \\ u = 0, & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

enunciado na Proposição 3.0.2, para $g \in L^\infty(\Omega)$, $g \geq 0$, $1 \leq l < p$ e $\alpha, s > 0$. Este resultado generaliza o Teorema 2.1, demonstrado por Garcia Azorero e Peral Alonso em [24] e também mostra que, com respeito à existência de soluções, uma restrição para o parâmetro m em (P) é de se esperar quando $1 \leq l < p$.

No Capítulo 4, provamos a convergência uniforme da família de soluções (u_p) à função distância d_Ω (Teorema 4.2.2). Inicialmente provamos que, a menos de subsequências,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} u_p = u_\infty \quad (1)$$

uniformemente em $\bar{\Omega}$, com $u_\infty \in W^{1,\infty}(\Omega) \cap C_0(\bar{\Omega})$, tal que

$$0 \leq u_\infty \leq d_\Omega.$$

Para obter esta convergência, provamos alguns resultados assintóticos na Seção 4.1. Em particular, mostramos que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} k_p = 1,$$

em que

$$k_p := \sup_{w \in \mathcal{S}_p} \|\nabla w\|_\infty, \quad (2)$$

e

$$\mathcal{S}_p := \{w \in W_0^{1,p}(\Omega) : -\Delta_p w = g \text{ em } \Omega, \text{ para alguma } g \in L^\infty(\Omega), \|g\|_\infty = 1\}. \quad (3)$$

Um passo crucial na prova deste limite é dado pela seguinte estimativa

$$\|\nabla w\|_\infty \leq (cp^\gamma)^{\frac{1}{p-1}} \quad \text{para todo } w \in \mathcal{S}_p, \quad p \geq 2,$$

em que c e γ são constantes positivas independentes de p e w . Tal estimativa é uma adaptação para o p -Laplaciano, feita por Ercole em [18], de uma estimativa global para o gradiente de soluções para problemas mais gerais, provada por Cianchi e Maz'ya (ver [11]).

Ainda no Capítulo 4, provamos na Proposição 4.2.1 que $u_\infty = d_\Omega$. Este fato é obtido levando-se em conta que a solução u_p também é solução fraca do problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda |u|^{q-2} u + h_p & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega; \end{cases} \quad (4)$$

em que

$$h_p := \beta u_p^{a-1} |\nabla u_p|^b + m u_p^{l-1} e^{\alpha u_p^s}.$$

Devido ao fato de u_p ser o único minimizador positivo do funcional energia I_p associado ao problema (4), temos

$$I_p(u_p) \leq I_p(d_\Omega).$$

A partir desta desigualdade, do fato $d_\Omega - u_\infty \geq 0$ (dada em (4.19)) e da convergência uniforme de u_p para u_∞ , conseguimos provar que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \int_\Omega (d_\Omega^q - u_p^q) dx = \int_\Omega (d_\Omega^q - u_\infty^q) dx \geq 0, \quad (5)$$

donde concluímos que $d_\Omega = u_\infty$.

Os resultados dos Capítulos 2, 3 e 4, descritos nesta introdução, foram apresentados no artigo [14] y publicado.

No Capítulo 5, estudamos o comportamento assintótico, quando $p \rightarrow \infty$, de uma solução positiva u_p para o problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p u = |u|^{q-2} u + \mu |u|^{a-2} u |\nabla u|^{p-a} & \text{em } \Omega, \\ u = 0, & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

em que Ω é um domínio Lipschitz limitado de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 2$, e $q, a \geq 1$.

Este problema não possui um termo exponencial como o tratado no Capítulo 4. Em contrapartida, o expoente do termo convectivo é dependente de p . Provamos neste capítulo que se $0 < \mu < \|d_\Omega\|_\infty^{-a}$, então u_p converge uniformemente em $\bar{\Omega}$ para d_Ω , quando $p \rightarrow \infty$.

Capítulo 1

Preliminares

Neste capítulo, apresentamos uma coleção de definições e resultados que vamos precisar no resto do trabalho. A intenção deste capítulo é fazer mais fácil a leitura deste trabalho. Em general são apresentados resultados conhecidos, motivo pelo qual vamos omitir as provas deles, as quais podem ser encontradas na bibliografia citada.

1.1 A função distância até a fronteira

As definições e resultados abaixo, podem ser encontrados em [26].

Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, um domínio suave e limitado. Definimos a **função distância** d_Ω até a fronteira $\partial\Omega$ como sendo

$$d_\Omega(x) := \min_{y \in \partial\Omega} |x - y|, \quad x \in \overline{\Omega}.$$

Algumas propriedades conhecidas da função d_Ω :

1. $d_\Omega \in C_0(\overline{\Omega}) \cap W^{1,\infty}(\Omega)$,
2. $|\nabla d_\Omega(x)| = 1$, q.t.p em Ω ,
3. $\|d_\Omega\|_\infty$ é o raio de maior bola inscrita em $\overline{\Omega}$.

Mais detalhes podem ser encontrados em [26].

Consideremos v uma outra função em $C_0(\overline{\Omega}) \cap W^{1,\infty}(\Omega)$. Fixando $x \in \Omega$, escolhemos

$y \in \partial\Omega$, tal que $d_\Omega(x) = |x - y|$. Como v se anula na fronteira,

$$|v(x)| = |v(x) - v(y)| \leq |x - y| \|\nabla v\|_\infty = d_\Omega(x) \|\nabla v\|_\infty, \quad (1.1)$$

onde a desigualdade na passagem anterior é devido ao Teorema do Valor Médio, uma vez que o segmento de reta $[x, y] \subset \Omega$. Logo, da desigualdade (1.1) temos que

$$\|v\|_\infty \leq \|d_\Omega\|_\infty \|\nabla v\|_\infty, \text{ para todo } v \in W^{1,\infty}(\Omega) \cap C_0(\bar{\Omega}). \quad (1.2)$$

1.2 O operador p -Laplaciano

Consideremos o problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p u = f & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.3)$$

em que $p > 1$, $f \in (W_0^{1,p}(\Omega))'$ e $\Delta_p u := \operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u)$ é o **operador p -Laplaciano**.

Dizemos que $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ é solução fraca de (1.3), se

$$\int_\Omega |\nabla u|^{p-2} \nabla u \nabla v \, dx = \int_\Omega f v \, dx, \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

Mais detalhes deste operador podem ser vistos em [17].

1.3 O problema de autovalor do p -Laplaciano

Consideremos o problema de Dirichlet do p -Laplaciano dado por

$$\begin{cases} -\Delta_p v = \lambda |v|^{p-2} v & \text{em } \Omega, \\ v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (1.4)$$

em que $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ é um domínio limitado e $N \geq 1$ e $1 < p < \infty$.

Definição 1.3.1. Dizemos que λ é um **autovalor** de (1.4) se existir uma função $u \in W_0^{1,p}(\Omega) - \{0\}$, tal que

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^{p-2} \nabla u \nabla v \, dx = \lambda \int_{\Omega} |u|^{p-2} uv \, dx, \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega). \quad (1.5)$$

A função u é chamada de **autofunção**.

Notemos que em (1.5), tomando $v = u$, λ pode ser escrito como

$$\lambda = \frac{\int_{\Omega} |\nabla u|^p \, dx}{\int_{\Omega} |u|^p \, dx}.$$

O problema (1.4) tem um menor autovalor e uma primeira autofunção associada a ele.

1.4 O primeiro autovalor do p -Laplaciano

O **primeiro autovalor** do problema de Dirichlet do p -Laplaciano é denotado por λ_p e definido como

$$\lambda_p := \min \left\{ \frac{\|\nabla v\|_p^p}{\|v\|_p^p} : v \in W_0^{1,p}(\Omega) \setminus \{0\} \right\} = \frac{\|\nabla e_p\|_p^p}{\|e_p\|_p^p} \quad (1.6)$$

em que e_p denota a **primeira autofunção** positiva associada ao primeiro autovalor λ_p . Consideramos a autofunção e_p como L^∞ -normalizada, isto é, $e_p > 0$ em Ω e $\|e_p\|_\infty = 1$. Lembremos que a autofunção $e_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ é uma solução fraca do problema (1.4).

Na sequência, apresentamos um resultado provado por Juutinen, Lindqvist e Manfredi que relaciona o primeiro autovalor do p -Laplaciano com a função distância (para mais detalhes, ver [26], Lema 1.5).

Lema 1.4.1. *Tem-se*

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \lambda_p^{1/p} = \|d_\Omega\|_\infty^{-1}.$$

Teorema 1.4.2. *Dada uma sequência (p_n) , com $p_n \rightarrow \infty$, existem uma subsequência (p_{n_j}) e uma função $e_\infty \in W^{1,\infty}(\Omega) \cap C_0(\overline{\Omega})$, tais que: $\|e_\infty\|_\infty = 1$, $e_{p_{n_j}}$ converge uniformemente em $\overline{\Omega}$ para e_∞ , e*

$$0 < e_\infty \leq \frac{d_\Omega}{\|d_\Omega\|_\infty}, \quad \text{em } \Omega.$$

Observação 1.4.3. *A positividade estrita de e_∞ segue da Desigualdade de Harnack, provada em [4, Teorema 1] (ver também [30, Corolário 4.5]) devido a e_∞ ser ∞ -superharmônico e não ser identicamente zero ($\|e_\infty\|_\infty = 1$). A igualdade $e_\infty = \frac{d_\Omega}{\|d_\Omega\|_\infty}$ não vale para um*

domínio geral limitado Ω . Ela vale para bolas, anéis e estádios ¹ (ver [35]), mas não para quadrados (ver [26, Proposição 4.1]) e triângulos, por exemplo.

1.5 O problema de Torção

Para cada $p > 1$, denotamos por ϕ_p a **p -função de torção** associada a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$, isto é ϕ_p é a solução fraca, no espaço de Sobolev $W_0^{1,p}(\Omega)$, do **problema de torção**

$$\begin{cases} -\Delta_p v = 1 & \text{em } \Omega, \\ v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (1.7)$$

Portanto,

$$\int_{\Omega} |\nabla \phi_p|^{p-2} \nabla \phi_p \nabla v \, dx = \int_{\Omega} v \, dx, \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

O seguinte resultado de convergência, que será usado na Seção 4.2, foi provado por Bhattacharya, Di Benedetto e Manfredi em [5] na Proposição 2.1, Parte II e por Kawohl em [27], Teorema 1.

Teorema 1.5.1. *Tem-se*

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \phi_p = d_{\Omega}, \quad \text{uniformemente em } \bar{\Omega}.$$

1.6 O espaço de Lorentz

Nesta seção, introduziremos o espaço de Lorentz $L^{p,q}(\Omega)$, que é definido pelo conjunto das funções tais que o funcional $\|\cdot\|_{p,q}$ está bem definido em $L^{p,q}(\Omega)$. Além disso, veremos que para certos valores de p e q , o espaço $L^{p,q}(\Omega)$ é um espaço normado. Mais detalhes deste espaço podem ser vistos em [3].

Na sequência, definiremos alguns conceitos básicos que serão necessários no decorrer desta seção, tais como função distribuição e rearranjo. Assumiremos também que (Ω, Σ, μ) um espaço de medida σ -finito e que v é uma função Σ -mensurável em Ω , ou mensurável, caso não haja confusão.

¹um estádio é o fecho convexo da união de duas bolas com o mesmo raio e centros distintos.

Definição 1.6.1. A *função distribuição* μ_v de uma função mensurável v é definida por

$$\begin{aligned}\mu_v : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R}_+^* \cup \{+\infty\} \\ t &\longmapsto \mu_v(t) := \mu(\{x \in \mathbb{R} : |v(x)| > t\}).\end{aligned}$$

Notemos que a função distribuição μ_v depende apenas do valor absoluto $|v|$ da função v e que μ_v pode atingir o valor $+\infty$.

Exemplo 1.6.2. A *função distribuição* μ_v de uma função simples e não negativa v , definida por

$$v(x) = \sum_{j=1}^n a_j \chi_{E_j}(x),$$

em que os subconjuntos $E_j \subset \mathbb{R}$ são disjuntos dois a dois com medida μ -finita e $a_1 > a_2 > \dots > a_n > 0$. Se $t \geq a_1$, então $|v(x)| \leq t$; logo, $\mu_v(t) = 0$. Se $a_2 \leq t < a_1$, então $v(x) > t$ precisamente no conjunto E_1 ; logo $\mu_v(t) = \mu(E_1)$. Se $a_3 \leq t < a_2$, então $v(x) > t$ precisamente no conjunto $E_1 \cup E_2$; logo $\mu_v(t) = \mu(E_1 \cup E_2) = \mu(E_1) + \mu(E_2)$.

Em geral,

$$\mu_v(t) = \sum_{j=1}^n m_j \chi_{[a_{j+1}, a_j)}(t),$$

para $t \in \mathbb{R}_+^*$, em que $a_{n+1} = 0$, para $j = 1, 2, \dots, n$,

$$m_j = \sum_{i=1}^j \mu(E_i).$$

Definição 1.6.3. Sejam v, v' funções Σ e Σ' mensuráveis, respectivamente. Dizemos que v e v' são funções *equimensuráveis* se $\mu_v(t) = \mu_{v'}(t)$, para qualquer $t > 0$.

Definição 1.6.4. Seja v uma função mensurável. O *rearrançamento decrescente* de v é a função

$$\begin{aligned}v^* : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ s &\longmapsto v^*(s) := \sup \{t \geq 0 : \mu_v(t) > s\}\end{aligned}$$

Notar que o rearrançamento decrescente v^* depende apenas do valor absoluto $|v|$ da função v .

Observação 1.6.5. Como uma consequência imediata da Definição 1.6.4, podemos obter

$$v^*(s) = \inf \{t \geq 0 : \mu_v(t) \leq s\} = m(\mu_v(t)), \quad (1.8)$$

em que m é a medida de Lebesgue.

Exemplo 1.6.6. Calculemos o rearranjo decrescente da função simples dada no Exemplo 1.6.2. Se $s \geq m_3$, então $v^*(s) = 0$. Se $m_3 > s \geq m_2$, então $v^*(s) = a_3$. Se $m_2 > s \geq m_1$, então $v^*(s) = a_2$. Se $0 \leq s < m_1$, então $v^*(s) = a_1$. Portanto,

$$v^*(s) = \sum_{j=1}^n a_j \chi_{[m_{j-1}, m_j)}(s),$$

em que $m_0 := 0$.

Definição 1.6.7. Seja (Ω, Σ, μ) um espaço de medida completo σ -finito; sejam $1 \leq p$ e $1 \leq q \leq \infty$. O **espaço de Lorentz** $L^{p,q}(\Omega)$ é constituído por todas as funções Σ -mensuráveis v , para as quais a quantidade $\|v\|_{p,q}$ é finita, em que

$$\|v\|_{p,q} := \begin{cases} \left(\int_{\mathbb{R}_+} \left(t^{\frac{1}{p}} v^*(t) \right)^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}}, & \text{se } 0 < q < \infty, \\ \sup_{t>0} \left(t^{\frac{1}{p}} v^*(t) \right), & \text{se } q = \infty. \end{cases}$$

Pode-se conferir que o espaço de Lorentz é um espaço linear. Além disso, o funcional $\|\cdot\|_{p,q}$ é uma seminorma, pois este funcional não satisfaz a desigualdade triangular para todo $1 < p < +\infty$ e $1 \leq q \leq +\infty$.

Exemplo 1.6.8. A quantidade $\|v\|_{1,\infty}$ é uma seminorma e não vale a desigualdade triangular. Consideremos as funções

$$u(x) = \frac{1}{x} \chi_{(0,1)}(x) \quad e \quad v(x) = \frac{1}{1-x} \chi_{(0,1)}(x).$$

Então,

$$\|u\|_{1,\infty} = 1 \quad e \quad \|v\|_{1,\infty} = 1.$$

Entretanto, $\|u+v\|_{1,\infty} \not\leq \|u\|_{1,\infty} + \|v\|_{1,\infty}$, pois $\|u+v\|_{1,\infty} = 4$.

Em geral, vale a desigualdade $\|u+v\|_{p,q} \leq 2\|u\|_{p,q} + 2\|v\|_{p,q}$.

Teorema 1.6.9. *Sejam $1 \leq q \leq p < +\infty$ ou $p = q = +\infty$. Então $(L^{p,q}(\Omega), \|\cdot\|_{p,q})$ é um espaço de Banach invariante por rearranjos.*

Proposição 1.6.10. *Seja (Ω, Σ, μ) um espaço de medida completo σ -finito e v uma função mensurável. Então, cumpre-se*

- Se $1 \leq p$, então $L^{p,p}(\Omega) = L^p(\Omega)$. Isto é, $\|v\|_{p,p} = \|v\|_p$
- $L^{\infty,q}(\Omega) = \{0\}$
- Para $1 \leq p \leq +\infty$ e $1 \leq q_1 \leq q_2 \leq +\infty$, vale a desigualdade

$$\|v\|_{p,q_2} \leq c(p, q_1, q_2) \|v\|_{p,q_1}, \text{ isto é } L^{p,q_1} \subset L^{p,q_2}.$$

Definição 1.6.11. *Seja v uma função mensurável. Então a **função maximal** é definida por*

$$v^{**} : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

$$s \longmapsto v^{**}(s) := \frac{1}{s} \int_0^s v^*(r) dr.$$

Observação 1.6.12. *No Teorema 1.6.9 é usada a hipótese restritiva $q \leq p$. Entretanto, no caso $1 < p$ é possível substituir $\|\cdot\|_{p,q}$ por um funcional equivalente que é norma para todo $1 \leq q$. A ideia é substituir v^* por v^{**} na Definição 1.6.7 de $\|\cdot\|_{p,q}$.*

Definição 1.6.13. *Se $1 < p \leq +\infty$ e $1 \leq q \leq +\infty$. Para v , função mensurável, definimos a quantidade*

$$\|v\|_{p,q}^* := \begin{cases} \left(\int_{\mathbb{R}_+} \left(t^{\frac{1}{p}} v^{**}(t) \right)^q \frac{dt}{t} \right)^{\frac{1}{q}}, & \text{se } 0 < q < +\infty, \\ \sup_{t>0} t^{\frac{1}{p}} v^{**}(t), & \text{se } q = +\infty. \end{cases}$$

finita.

Lema 1.6.14. *Se $1 < p \leq +\infty$ e $1 \leq q \leq +\infty$, então para toda função mensurável v , valem as desigualdades*

$$\|v\|_{p,q} \leq \|v\|_{p,q}^* \leq p' \|v\|_{p,q},$$

em que $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Em particular, $L^{p,q}(\Omega)$ consiste de todas as funções para as quais $\|v\|_{p,q}^*$ é finita.

Teorema 1.6.15. *Se $1 < p < +\infty$ e $1 \leq q \leq +\infty$, ou $p = q = +\infty$. Então, $(L^{p,q}(\Omega), \|\cdot\|_{p,q}^*)$ é um espaço de Banach, invariante por rearranjos.*

Observação 1.6.16. *Nem todos os espaços de Lorentz são espaços invariantes por rearranjos. Por exemplo, o espaço de Lorentz $L^{1,\infty}(\Omega)$ não é invariante por rearranjo.*

A seguinte proposição, que pode ser encontrada em [3], Proposition 1.7, permite expressar a norma de uma função $v \in L^\infty(\Omega)$ em termos do seu rearranjo.

Proposição 1.6.17. *Seja $v : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ uma função mensurável e v^* o rearranjo de v . Então v e v^* são equimensuráveis. Isto é, $\mu_v = \mu_{v^*}$.*

Agora, tomemos $v \in L^\infty(\Omega)$. Então, da Observação 1.6.5 e da proposição anterior,

$$\begin{aligned} \|v\|_\infty &= \inf \{C > 0 : \mu_v(\{x \in \Omega : |v(x)| > C\}) = 0\} \\ &= \inf \{C > 0 : \mu_{v^*}(\{x \in \Omega : |v(x)| > C\}) = 0\} = \|v^*\|_\infty. \end{aligned} \quad (1.9)$$

Se $v \in L^p(\Omega)$ também temos que $v^* \in L^p([0, |\Omega|])$ e

$$\|v\|_p = \|v^*\|_{L^p([0, |\Omega|])}. \quad (1.10)$$

Enunciaremos a desigualdade de Hölder para os espaços de Lorentz.

Teorema 1.6.18 (Desigualdade de Hölder). *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$. Suponha que $1 < p < +\infty$ e $1 \leq q \leq +\infty$. Se $u \in L^{p,q}(\Omega)$ e $v \in L^{p',q'}(\Omega)$. Então,*

$$\int_\Omega |u(x)v(x)| dx \leq \int_0^\infty u^*(t)v^*(t) dt \leq \|u\|_{p,q} \|v\|_{p',q'},$$

em que p' e q' são conjugados de p e q , respectivamente.

1.7 O espaço de Lorentz-Sobolev

Esta seção está baseada no Capítulo 4 do trabalho de Serban Costea, em [12] e no Capítulo 2 do trabalho de Cianchi e Mas'ya [11].

Seja Ω um aberto de $\mathbb{R}^N$. Denotemos por $L^{p,q}(\Omega, \mathbb{R}^M)$ ao espaço de funções

$$f = (f_1, f_2, \dots, f_M) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^M,$$

tais que $f_i \in L^{p,q}(\Omega)$.

Definição 1.7.1. *Seja uma função vetorial mensurável $f = (f_1, f_2, \dots, f_M) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ e denotemos por $|f| := \sqrt{f_1^2 + f_2^2 + \dots + f_M^2}$. Dizemos que*

$$f \in L^{p,q}(\Omega, \mathbb{R}^M) \iff f_i \in L^{p,q}(\Omega), \text{ para } i = 1, 2, \dots, M \iff |f| \in L^{p,q}(\Omega).$$

Além disso, usando a norma dos espaços de Lorentz, definimos

$$\|f\|_{L^{p,q}(\Omega, \mathbb{R}^M)} := \||f|\|_{p,q}.$$

Observação 1.7.2. *O espaço $L^{p,q}(\Omega, \mathbb{R}^M)$ com a norma $\|\cdot\|_{L^{p,q}(\Omega, \mathbb{R}^M)}$ é um espaço de Banach, para $1 < p < \infty, 1 \leq q \leq \infty$ (ver [12] para mais detalhes).*

Definição 1.7.3. *Sejam $1 < p < \infty, 1 \leq q \leq \infty$ e seja $m \in \mathbb{N}$. O espaço de **Sobolev-Lorentz** $W^m L^{p,q}(\Omega)$ é o espaço de Banach definido como*

$$W^m L^{p,q}(\Omega) := \left\{ u \in L^{p,q}(\Omega), \text{ é } m\text{-vezes fracamente diferenciável em } \Omega \right. \\ \left. \text{e } |\nabla^k u| \in L^{p,q}(\Omega), \text{ para } 1 \leq k \leq m \right\}$$

com a norma

$$\|u\|_{W^m L^{p,q}(\Omega)} := \|u\|_{L^{p,q}(\Omega)} + \sum_{k=1}^m \|\nabla^k u\|_{L^{p,q}(\Omega)},$$

em que $\nabla^k u$ denota o vector de todas as derivadas fracas de u , de ordem k .

Capítulo 2

Existência de soluções do problema de Dirichlet com termos de convecção e de crescimento exponencial

Neste capítulo consideraremos o problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda u^{q-1} + \beta u^{a-1} |\nabla u|^b + m u^{l-1} e^{\alpha u^s} & \text{em } \Omega, \\ u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (P)$$

em que Ω é um domínio suave e limitado de $\mathbb{R}^N$, com $N \geq 2$, e $\Delta_p u := \operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u)$ é o operador p -Laplaciano, $p > 1$. Os parâmetros λ , β e m , são não negativos e as constantes q, a, b, l, α e s satisfazem

$$a, l \geq 1, \quad b > 0, \quad s, \alpha \geq 0, \quad \text{e } p > q \geq 1.$$

Antes, vamos recordar as seguintes notações (veja Capítulo 1):

- 1) d_Ω é a função distância até a fronteira de Ω .
- 2) ϕ_p é a p -função de torção.
- 3) λ_p é o primeiro autovalor do p -Laplaciano.
- 4) e_p é a autofunção correspondente a λ_p , positiva em Ω e normalizada na norma $L^\infty(\Omega)$.

A solução u_p do Teorema 4.2.2 é obtida como uma aplicação do Teorema 2.0.1 o qual será enunciado em breve.

Definimos

$$k_p := \sup_{w \in \mathcal{S}_p} \|\nabla w\|_\infty, \quad (2.1)$$

em que

$$\mathcal{S}_p := \left\{ w \in W_0^{1,p}(\Omega) : -\Delta_p w = g \text{ em } \Omega, \text{ para alguma } g \in L^\infty(\Omega), \|g\|_\infty = 1 \right\}. \quad (2.2)$$

Para cada $M > 0$, denotemos por $\mathcal{E}(M)$ a região de $\mathbb{R}_+^3$ definida por

$$\mathcal{E}(M) := \left\{ (\lambda, \beta, m) \in \mathbb{R}_+^3 : \frac{\lambda A_p}{M^{p-q}} + \frac{\beta B_p}{M^{p-(a+b)}} + \frac{mA_p}{M^{p-l}e^{-\alpha M^s}} \leq 1 \right\}, \quad (2.3)$$

em que

$$A_p := \|\phi_p\|_\infty^{p-1} \quad \text{e} \quad B_p := k_p^b \|\phi_p\|_\infty^{p-1-b}. \quad (2.4)$$

Agora, podemos enunciar nosso principal resultado de existência.

Teorema 2.0.1. *Assuma que $\partial\Omega \in C^{1,\tau}$ para algum $\tau \in (0, 1)$. Se $(\lambda, \beta, m) \in \mathcal{E}(M)$ para algum $M > 0$, então o problema de Dirichlet (P) admite pelo menos uma solução fraca $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ tal que*

$$\left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{1/(p-q)} e_p \leq u_p \leq \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \phi_p \quad \text{e} \quad \|\nabla u_p\|_\infty \leq \frac{k_p M}{\|\phi_p\|_\infty}. \quad (2.5)$$

2.1 Definições e resultados preliminares

Nesta seção vamos assumir que $\partial\Omega$ é ao menos de classe $C^{1,\tau}$, para algum $\tau \in (0, 1)$.

Relembremos que no caso particular em que Ω é uma bola centrada em $x_0 \in \mathbb{R}^N$ com raio $R > 0$, a solução explícita para ϕ_p foi apresentada por Sakaguchi em [34] e explorada por Kawohl em [27]. A função ϕ_p é radialmente simétrica, radialmente decrescente e explicitamente dada pela expressão,

$$\phi_p(x) = \frac{p-1}{p} N^{-\frac{1}{p-1}} \left(R^{\frac{p}{p-1}} - |x - x_0|^{\frac{p}{p-1}} \right), \quad |x - x_0| \leq R.$$

Segue da expressão anterior que

$$\|\phi_p\|_\infty = \frac{p-1}{p} N^{-\frac{1}{p-1}} R^{\frac{p}{p-1}}. \quad (2.6)$$

Para um domínio limitado geral Ω , podemos combinar a simetrização de Schwarz com a igualdade (2.6) e obter

$$\|\phi_p\|_\infty \leq M_0 := \frac{p-1}{p} N^{-\frac{1}{p-1}} \left(\frac{|\Omega|}{\omega_N} \right)^{\frac{p}{N(p-1)}}, \quad (2.7)$$

em que $|\Omega|$ denota o volume de Ω e ω_N denota o volume da bola unitária (Veja: [27]).

Na sequência, $|\cdot|_{1,\eta}$ denotará a norma de $C^{1,\eta}(\bar{\Omega})$ definida por

$$|u|_{1,\eta} := \|u\|_\infty + \|\nabla u\|_\infty + \sum_{i=1}^N [u_{x_i}]_\eta$$

em que

$$[u_{x_i}]_\eta := \sup \left\{ \frac{|u_{x_i}(x) - u_{x_i}(y)|}{|x - y|^\eta} : x, y \in \bar{\Omega} \text{ e } x \neq y \right\}$$

para cada $i \in \{1, 2, \dots, N\}$.

O conjunto $\mathcal{S}_p$, que aparece na sequência, foi definido em (2.2).

Proposição 2.1.1. *Se $u \in \mathcal{S}_p$, então*

$$|u(x)| \leq \phi_p(x) \quad \forall x \in \bar{\Omega}. \quad (2.8)$$

Além disso, existem constantes positivas η_p e K_p , tais que $u \in C^{1,\eta_p}(\bar{\Omega})$ e

$$|u|_{1,\eta_p} \leq K_p.$$

Demonstração. A desigualdade (2.8) pode ser obtida aplicando o Princípio de Comparação (Teorema C.0.1) às funções u e $-u$.

Como $u \in \mathcal{S}_p$, então $-\Delta_p u = g$, para algum $g \in L^\infty(\Omega)$, $\|g\|_\infty = 1$. Temos também que

$\phi_p \in \mathcal{S}_p$, pois $\phi_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ é solução fraca do problema de torção $-\Delta_p \phi_p = 1$. Assim,

$$-\Delta_p u = g \leq 1 = -\Delta_p \phi_p, \text{ em } \Omega \quad \text{e} \quad u = \phi_p = 0, \text{ em } \partial\Omega. \quad (2.9)$$

Considerando o mesmo raciocínio, conseguimos um resultado análogo para a função $-u$. Logo, pelo Teorema C.0.1 e da expressão (2.9), conseguimos

$$u(x) \leq \phi_p(x) \quad \text{e} \quad -\phi_p(x) \leq u(x), \quad \forall x \in \bar{\Omega}.$$

Além disso, considerando (2.7) e (2.8), obtemos

$$|u(x)| \leq \phi_p(x) \leq \|\phi_p\|_\infty \leq M_0,$$

isto é,

$$|u| \leq M_0. \quad (2.10)$$

A outra afirmação segue da desigualdade (2.10) e dos conhecidos resultados de regularidade de Lieberman [29, Teorema 1], aplicados ao p -Laplaciano. $\square$

Observação 2.1.2. *Da Proposição 2.1.1 temos*

i) Em concordância com [29, Teorema 1], as constantes η_p e K_p dependem apenas de τ , N , p , M_0 e Ω .

ii) Da Proposição 2.1.1 e da definição de $|\cdot|_{1,\eta}$, temos

$$K_p \geq |u|_{1,\eta} = \|u\|_\infty + \|\nabla u\|_\infty + \sum_{i=1}^N [u_{x_i}]_\eta \geq \|\nabla u\|_\infty.$$

Desta última desigualdade e pela definição de k_p dada em (2.1), obtemos $k_p \leq K_p$, portanto

$$0 < \|\nabla \phi_p\|_\infty \leq k_p \leq K_p, \quad \text{sempre que } p > 1,$$

iii) Da desigualdade dada em (1.2) para a função distância, temos

$$\|v\|_\infty \leq \|d_\Omega\|_\infty \|\nabla v\|_\infty \quad \forall v \in W^{1,\infty}(\Omega) \cap C_0(\bar{\Omega}),$$

e, com isso, conseguimos um limite inferior para k_p em termos de $\|\phi_p\|_\infty$ e $\|d_\Omega\|_\infty$:

$$\frac{\|\phi_p\|_\infty}{\|d_\Omega\|_\infty} \leq \|\nabla \phi_p\|_\infty \leq k_p, \quad \text{sempre que } p > 1. \quad (2.11)$$

Corolário 2.1.3. *Se $g \in L^\infty(\Omega)$ e $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ é a solução fraca do problema*

$$\begin{cases} -\Delta_p v = g & \text{em } \Omega, \\ v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

então $u \in C^{1,\eta_p}(\overline{\Omega})$ e as seguintes estimativas são satisfeitas

$$|u(x)| \leq \|g\|_\infty^{1/(p-1)} \phi_p(x) \quad \forall x \in \overline{\Omega}, \quad (2.12)$$

$$|u|_{1,\eta_p} \leq K_p \|g\|_\infty^{1/(p-1)}, \quad (2.13)$$

e

$$\|\nabla u\|_\infty \leq k_p \|g\|_\infty^{1/(p-1)}. \quad (2.14)$$

Demonstração. Na prova deste corolário é suficiente considerar o caso $\|g\|_\infty \neq 0$. Definamos,

$$v := \frac{u}{\|g\|_\infty^{1/(p-1)}} \quad \text{e} \quad \tilde{g} := \frac{g}{\|g\|_\infty}.$$

Como o operador Δ_p é $(p-1)$ -homogêneo

$$\Delta_p v = \Delta_p \left(\frac{u}{\|g\|_\infty^{1/(p-1)}} \right) = \frac{\Delta_p u}{\|g\|_\infty},$$

com isto e da hipótese temos

$$-\Delta_p v = \frac{g}{\|g\|_\infty} = \tilde{g},$$

obtendo $v = \frac{u}{\|g\|_\infty^{1/(p-1)}} \in \mathcal{S}_p$. Assim, pela Proposição 2.1.1 conseguimos

$$\frac{u}{\|g\|_\infty^{1/(p-1)}} \in C^{1,\eta_p}(\overline{\Omega}) \quad \text{e} \quad \left| \frac{u(x)}{\|g\|_\infty^{1/(p-1)}} \right| \leq \phi_p(x), \quad \forall x \in \overline{\Omega},$$

donde obtemos $u \in C^{1,\eta_p}(\overline{\Omega})$ e a estimativa dada em (2.12), isto é

$$|u(x)| \leq \|g\|_\infty^{1/(p-1)} \phi_p(x), \quad \forall x \in \overline{\Omega}.$$

Uma vez que $\frac{u}{\|g\|_\infty^{1/(p-1)}} \in \mathcal{S}_p$, da Proposição 2.1.1 conseguimos a estimativa (2.13), isto é

$$\left| \frac{u}{\|g\|_\infty^{1/(p-1)}} \right|_{1,\eta_p} \leq K_p \iff |u|_{1,\eta_p} \leq K_p \|g\|_\infty^{1/(p-1)}.$$

Como $\frac{u}{\|g\|_\infty^{1/(p-1)}} \in \mathcal{S}_p$, da definição de k_p , dada em (2.1), obtemos a estimativa (2.14)

$$\left\| \nabla \left(\frac{u}{\|g\|_\infty^{1/(p-1)}} \right) \right\|_\infty = \left\| \frac{\nabla u}{\|g\|_\infty^{1/(p-1)}} \right\|_\infty \leq k_p \iff \|\nabla u\| \leq k_p \|g\|_\infty^{1/(p-1)}.$$

□

O seguinte lema estabelece uma relação entre as quantidades λ_p e $\|\phi_p\|_\infty$ que, entre outras utilidades, fornece uma cota inferior para o primeiro autovalor do p -Laplaciano em termos da p -função de torção.

Lema 2.1.4. *A seguinte desigualdade vale para todo $p > 1$:*

$$1 \leq \lambda_p^{1/(p-1)} \|\phi_p\|_\infty. \quad (2.15)$$

Demonstração. Como e_p é solução do problema do autovalor associado a λ_p e ϕ_p é solução do problema de p -torção, novamente usando a homogeneidade do operador Δ_p e lembrando que e_p é $L^\infty(\Omega)$ -normalizado,

$$-\Delta_p e_p = \lambda_p e_p^{p-1} \leq \lambda_p \|e_p\|_\infty^{p-1} = \lambda_p = -\Delta_p (\lambda_p^{1/(p-1)} \phi_p), \text{ em } \Omega.$$

Por hipótese, temos $e_p = \phi_p = 0$ sobre $\partial\Omega$. Logo, pelo Teorema C.0.1 e pelo Princípio da Comparação

$$e_p \leq \lambda_p^{1/(p-1)} \phi_p, \text{ em } \Omega.$$

Portanto,

$$1 = \|e_p\|_\infty \leq \lambda_p^{1/(p-1)} \|\phi_p\|_\infty.$$

□

2.2 Prova do resultado principal

Agora, apresentamos a prova do nosso resultado principal.

Demonstração do Teorema 2.0.1 . Da definição de $\mathcal{E}(M)$, dada em (2.3), temos

$$\lambda \frac{A_p}{M^{p-q}} + \beta \frac{B_p}{M^{p-(a+b)}} + m \frac{A_p}{M^{p-l} e^{-\alpha M^s}} \leq 1. \quad (2.16)$$

Consideremos o subconjunto fechado, convexo e limitado $F \subset C^1(\overline{\Omega})$ definido por

$$F := \left\{ u \in C^1(\overline{\Omega}) : \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{1/(p-q)} e_p \leq u \leq \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \phi_p \text{ e } \|\nabla u\|_\infty \leq \frac{k_p M}{\|\phi_p\|_\infty} \right\}. \quad (2.17)$$

Definamos um operador que associa a cada elemento deste subconjunto um elemento do espaço de Sobolev $W_0^{1,p}(\Omega)$:

$$\begin{aligned} T : F \subset C^1(\overline{\Omega}) &\longrightarrow C^1(\overline{\Omega}) \\ u &\longmapsto T(u) \end{aligned}$$

em que $T(u) \in W_0^{1,p}(\Omega)$ é a única função satisfazendo

$$\begin{cases} -\Delta_p(T(u)) = \lambda(T(u))^{q-1} + \beta u^{a-1} |\nabla u|^b + m u^{l-1} e^{\alpha u^s} & \text{em } \Omega, \\ T(u) = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (2.18)$$

Assim, para cada $u \in F$ a função $U = T(u)$ é a única solução fraca no espaço $W_0^{1,p}(\Omega)$ do problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p v = g_u(x, v) & \text{em } \Omega, \\ v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (2.19)$$

em que a não linearidade $g_u(x, t)$ é definida pela expressão

$$g_u(x, t) := \lambda t^{q-1} + \beta u(x)^{a-1} |\nabla u(x)|^b + m u(x)^{l-1} e^{\alpha u(x)^s}, \quad x \in \overline{\Omega} \text{ e } t \geq 0. \quad (2.20)$$

Temos a unicidade da solução U ao escrever

$$g_u(x, t) = \lambda t^{q-1} + h(x)$$

com $h \in L^\infty(\Omega)$, $h \geq 0$ e $1 < q < p$, e aplicar resultados de Díaz e Saa em [16] (veja Corolário E.0.2).

Para provar a existência da função U , usaremos o método de sub-supersolução (veja

Teorema D.0.3). Sejam,

$$\bar{u} := \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \phi_p \quad \text{e} \quad \underline{u} := \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{1/(p-q)} e_p.$$

Provaremos que $\bar{u}$ é supersolução e $\underline{u}$ é subsolução do problema (2.19) e também que $\underline{u} \leq \bar{u}$ em Ω . Com efeito, como $u \in F$, temos

$$0 \leq u \leq \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \phi_p \leq M \quad \text{em } \Omega,$$

daí,

$$e^{\alpha u^s} \leq e^{\alpha M^s} \quad \text{e} \quad u^{l-1} \leq M^{l-1}.$$

Portanto,

$$0 \leq u^{l-1} e^{\alpha u^s} \leq M^{l-1} e^{\alpha M^s} \quad \text{em } \Omega. \quad (2.21)$$

Da definição de F obtemos,

$$0 \leq |\nabla u| \leq \|\nabla u\|_\infty \leq \frac{k_p M}{\|\phi_p\|_\infty} \quad \text{em } \Omega. \quad (2.22)$$

Mais ainda, a definição de supersolução nos dá

$$0 \leq \bar{u} := \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \phi_p \leq M \quad \text{em } \Omega. \quad (2.23)$$

Além disso, multiplicando ambos os lados a expressão (2.16) por $\left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^{p-1}$ e lembrando as definições de A_p e B_p , dadas em (2.4), temos

$$\lambda M^{q-1} + \beta M^{a-1} \left(\frac{k_p M}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^b + m M^{l-1} e^{\alpha M^s} \leq \left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^{p-1}. \quad (2.24)$$

Assim, das expressões (2.21), (2.22), (2.23) e da última desigualdade (2.24), temos

$$\begin{aligned} g_u(x, \bar{u}(x)) &= \lambda \bar{u}(x)^{q-1} + \beta u(x)^{a-1} |\nabla u(x)|^b + m u(x)^{l-1} e^{\alpha u(x)^s} \\ &\leq \lambda M^{q-1} + \beta M^{a-1} \left(\frac{k_p M}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^b + m M^{l-1} e^{\alpha M^s} \leq \left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^{p-1}. \end{aligned}$$

Isto é,

$$g_u(x, \bar{u}(x)) \leq \left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^{p-1}, \quad \forall x \in \Omega. \quad (2.25)$$

Da homogeneidade de Δ_p , do fato de que $-\Delta_p \phi_p = 1$ em Ω e da desigualdade (2.25), decorre que

$$-\Delta_p \bar{u} = -\Delta_p \left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \phi_p \right) = \left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^{p-1} (-\Delta_p \phi_p) = \left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^{p-1} \geq g(x, \bar{u}), \text{ em } \Omega.$$

Portanto, como $\bar{u} = \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \phi_p = 0$ sobre $\partial\Omega$, concluímos que $\bar{u}$ é uma supersolução do problema (2.19).

Agora provaremos que $\underline{u} := \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{1/(p-q)} e_p$ é uma subsolução do problema (2.19). Uma vez que $e_p^{p-q} \leq \|e_p\|_\infty^{p-q} \leq 1$ em Ω , temos que

$$\begin{aligned} -\Delta_p \underline{u} &= -\Delta_p \left(\left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{1/(p-q)} e_p \right) = \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{(p-1)/(p-q)} (-\Delta_p e_p) \\ &= \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{(p-1)/(p-q)} \lambda_p e_p^{p-1} = \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right) \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{(q-1)/(p-q)} \lambda_p e_p^{p-q} e_p^{q-1} \\ &\leq \lambda \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{(q-1)/(p-q)} e_p^{q-1} = \lambda \underline{u}^{q-1} \leq g(x, \underline{u}), \text{ em } \Omega. \end{aligned}$$

Portanto, como $\underline{u} := \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{1/(p-q)} e_p = 0$ sobre $\partial\Omega$, concluímos que $\underline{u}$ é uma subsolução do problema (2.19).

Na sequência, provaremos que $\underline{u} \leq \bar{u}$ em Ω . Substituindo a definição de A_p , dada em (2.4), na desigualdade (2.16) e considerando apenas o primeiro termo do lado direito dessa desigualdade, decorre que

$$\lambda \frac{\|\phi_p\|_\infty^{p-1}}{M^{p-q}} \leq 1 \iff M \geq (\lambda \|\phi_p\|_\infty^{p-1})^{1/(p-q)} = (\lambda \|\phi_p\|_\infty^{p-q} \|\phi_p\|_\infty^{q-1})^{1/(p-q)}.$$

Logo,

$$\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \geq (\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1})^{1/(p-q)} = \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{1/(p-q)} \lambda_p^{1/(p-q)} \|\phi_p\|_\infty^{(q-1)/(p-q)}. \quad (2.26)$$

Além disso, do Lema 2.1.4 obtemos

$$\begin{aligned} \lambda_p^{1/(p-1)} \|\phi_p\|_\infty \geq 1 &\iff \|\phi_p\|_\infty^{(q-1)/(p-q)} \geq (\lambda_p^{-1/(p-1)})^{(q-1)/(p-q)} \\ &\iff \lambda_p^{1/(p-q)} \|\phi_p\|_\infty^{(q-1)/(p-q)} \geq \lambda_p^{1/(p-q)} (\lambda_p^{-1/(p-1)})^{(q-1)/(p-q)} = \lambda_p^{1/(p-1)}. \end{aligned}$$

Daí,

$$\lambda_p^{1/(p-q)} \|\phi_p\|_\infty^{(q-1)/(p-q)} \geq \lambda_p^{1/(p-1)}.$$

Substituindo a última desigualdade na expressão (2.26),

$$\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \geq \left(\frac{\lambda}{\lambda_p}\right)^{1/(p-q)} \lambda_p^{1/(p-1)}.$$

Portanto,

$$\left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty}\right)^{p-1} \geq \left(\frac{\lambda}{\lambda_p}\right)^{(p-1)/(p-q)} \lambda_p. \quad (2.27)$$

Como $\underline{u} := \left(\frac{\lambda}{\lambda_p}\right)^{1/(p-q)} e_p$, da homogeneidade do operador Δ_p e pela desigualdade (2.27), temos que

$$\begin{aligned} -\Delta_p \underline{u} &= -\Delta_p \left(\left(\frac{\lambda}{\lambda_p}\right)^{1/(p-q)} e_p \right) = \left(\frac{\lambda}{\lambda_p}\right)^{(p-1)/(p-q)} \lambda_p e_p^{p-1} \\ &\leq \left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty}\right)^{p-1} e_p^{p-1} \leq \left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty}\right)^{p-1} = -\Delta_p \bar{u}, \end{aligned}$$

e pelo Princípio de Comparação (Teorema C.0.1), isto implica que $\underline{u} \leq \bar{u}$ em Ω .

Com isto provado, podemos usar o método de sub-supersolução (Teorema D.0.3), para obter a existência de uma solução fraca $U \in W_0^{1,p}(\Omega)$ para o problema (2.19), satisfazendo

$$\underline{u} = \left(\frac{\lambda}{\lambda_p}\right)^{1/(p-q)} e_p \leq U \leq \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty} \phi_p = \bar{u}, \quad \text{em } \Omega. \quad (2.28)$$

Além disso, como

$$\|g_u(x, U)\|_\infty \leq \lambda M^{q-1} + \beta M^{a-1} \left(\frac{k_p M}{\|\phi_p\|_\infty}\right)^b + mM^{l-1} e^{\alpha M^s} \leq \left(\frac{M}{\|\phi_p\|_\infty}\right)^{p-1}$$

decorre que $g_u \in L^\infty$. Então, do Corolário 2.1.3, $U = T(u) \in C^{1,\eta_p}(\bar{\Omega}) \subset C^1(\bar{\Omega})$, e valem

as estimativas

$$|U|_{1,\eta_p} \leq K_p \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty}$$

e

$$\|\nabla U\|_\infty \leq k_p \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty}. \quad (2.29)$$

Das expressões (2.28), (2.29) e como $U \in C^1(\overline{\Omega})$, da definição de F , dada em (2.17), concluímos que $U = T(u) \in F$, o que significa que F é invariante por T , isto é, $T(F) \subset F$. Pelo Teorema F.0.1, temos que a imersão, $C^{1,\eta_p}(\overline{\Omega}) \hookrightarrow C^1(\overline{\Omega})$ é compacta. Usando este fato, podemos verificar que o operador $T : F \rightarrow F$ é compacto. Portanto, estão satisfeitas as condições do Teorema G.0.2 (Teorema do Ponto Fixo de Schauder), o que garante a existência de um ponto fixo $u_p \in F$. Consequentemente, $T(u_p) = u_p$ no problema (2.18), isto é

$$\begin{cases} -\Delta_p u_p = \lambda u_p^{q-1} + \beta u_p^{a-1} |\nabla u_p|^b + m u_p^{l-1} e^{\alpha u_p^s} & \text{em } \Omega, \\ u_p = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

no sentido fraco. Além disso, como $u_p \in F$, valem as estimativas em (2.5).

□

Observação 2.2.1. *Bueno e Ercole em [9] limitam inferiormente o conjunto F , dado em (2.17), (o qual também é usado em [15]), para isto consideram o escalar ϵ , em que*

$$0 < \epsilon \leq \min \left\{ \left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{1/(p-q)}, \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty \lambda_p^{1/(p-1)}} \right\}$$

Graças à desigualdade (2.27), obtemos que $\left(\frac{\lambda}{\lambda_p} \right)^{1/(p-q)} \leq \frac{M}{\|\phi_p\|_\infty \lambda_p^{1/(p-1)}}$ e com isto, conseguimos melhorar o limite inferior do conjunto F .

2.3 Aplicações do resultado principal

2.3.1 Aplicação 1

Como uma simples aplicação do Teorema 2.0.1 temos o seguinte resultado de existência. Neste resultado vamos fixar os parâmetros λ e β . Além disso, considerando certas condições para p , obtemos solução para o problema (P) .

Corolário 2.3.1. *Suponha que $\partial\Omega \in C^{1,\tau}$ para algum $\tau \in (0,1)$. Sejam q, a, b, l, λ e β fixos, com $q, a, l \geq 1$; $b, \lambda, \beta > 0$, e $s, \alpha \geq 0$. Para cada*

$$p > \max \{q, a + b, l\},$$

existe uma constante positiva M_p satisfazendo

$$\lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} + \beta \frac{B_p}{M_p^{p-(a+b)}} = \frac{1}{2}. \quad (2.30)$$

Além disso, se

$$0 < m \leq m_p := \frac{M_p^{p-l}}{2A_p e^{\alpha M_p^s}}, \quad (2.31)$$

o problema (P) admite uma solução fraca $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ satisfazendo (2.5).

Demonstração. Motivados pela definição de $\mathcal{E}(M)$, dada em (2.3), definimos a função

$$\varphi(t) := \lambda \frac{A_p}{t^{p-q}} + \beta \frac{B_p}{t^{p-(a+b)}}, \quad t > 0.$$

Da hipótese do problema, $p > q \geq 1$ e como $p > \max \{q, a + b, l\}$, obtemos que φ satisfaz $\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(t) = +\infty$ e $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = 0$. Consequentemente, existe $M_p > 0$ tal que $\varphi(M_p) = \frac{1}{2}$, que é (2.30).

Para obter uma solução u_p , provaremos que $(\lambda, \beta, m) \in \mathcal{E}(M_p)$. Notamos da expressão de m_p em (2.31) que

$$\frac{m_p A_p}{M_p^{p-l} e^{-\alpha M_p^s}} = \frac{1}{2}.$$

Lembrando que $m \leq m_p$, temos de (2.30) e da última igualdade que

$$\frac{\lambda A_p}{M_p^{p-q}} + \frac{\beta B_p}{M_p^{p-(a+b)}} + \frac{m A_p}{M_p^{p-l} e^{-\alpha M_p^s}} \leq \frac{1}{2} + \frac{m_p A_p}{M_p^{p-l} e^{-\alpha M_p^s}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Assim, $(\lambda, \beta, m) \in \mathcal{E}(M_p)$ e, pelo Teorema 2.0.1, existe uma solução fraca $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$.

□

2.3.2 Aplicação 2

Agora apresentaremos algumas aplicações adicionais do Teorema 2.0.1 que estendem ou complementam alguns resultados recentes para problemas que envolvem termos exponenciais e termos de convecção.

Corolário 2.3.2. *Suponha que $\partial\Omega \in C^{1,\tau}$ para algum $\tau \in (0, 1)$. Sejam q, a, b, l, α, s e m fixados, com $p > q \geq 1$; $m, b > 0$; $\alpha, s \geq 0$; $a \geq 1$, e*

$$l > p \geq a + b.$$

Existe uma constante positiva M_p tal que se

$$(\lambda, \beta) \in \mathcal{D} := \left\{ (\lambda, \beta) \in \mathbb{R}_+^2 : \lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} + \beta \frac{B_p}{M_p^{p-(a+b)}} \leq \frac{1}{2} \right\}, \quad (2.32)$$

então o problema (P) admite uma solução fraca $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ que satisfaz (2.5).

Demonstração. Para cada $M > 0$, podemos escrever a desigualdade (2.16) como

$$\varphi_1(M) + \varphi_2(M) \leq 1, \quad (2.33)$$

em que

$$\varphi_1(t) := \lambda \frac{A_p}{t^{p-q}} + \beta \frac{B_p}{t^{p-(a+b)}}, \quad t > 0$$

e

$$\varphi_2(t) := mA_p t^{l-p} e^{\alpha t^s}, \quad t > 0.$$

Como $m, l - p > 0$ e $s, \alpha \geq 0$, temos que φ_2 é estritamente crescente e

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi_2(t) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_2(t) = \infty.$$

Logo, existe um único $M_p > 0$, tal que

$$\varphi_2(M_p) = \frac{1}{2}. \quad (2.34)$$

Com o intuito de obter o conjunto $\mathcal{D}$ dado na expressão (2.32), usaremos φ_1 e a constante

M_p . Com isto, de (2.33) e (2.34) obtemos,

$$\lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} + \beta \frac{B_p}{M_p^{p-(a+b)}} = \varphi_1(M_p) \leq \frac{1}{2}. \quad (2.35)$$

Assim, se $(\lambda, \beta) \in \mathcal{D}$ obtemos a desigualdade (2.16), com $M = M_p$, das expressões (2.33), (2.34) e (2.35). O resultado de existência é, então, obtido pelo Teorema 2.0.1. $\square$

Geometricamente, $\mathcal{D}$ é a região no quadrante $\mathbb{R}_+^2$ do $\lambda\beta$ -plano que está abaixo a reta

$$\lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} + \beta \frac{B_p}{M_p^{p-(a+b)}} = \frac{1}{2}.$$

No trabalho [13], de Araujo e Faria consideraram o problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_N u &= \gamma(a_1 u^{r_1} + a_2 |\nabla u|^{r_2}) + f(u) & \text{em } \Omega, \\ u &> 0 & \text{em } \Omega, \\ u &= 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases} \quad (2.36)$$

em que $0 < r_1, r_2 < N - 1$, $a_1 > 0$, $a_2 \geq 0$, e $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua satisfazendo

$$0 \leq f(t) \leq a_3 t^{r_3} e^{\alpha t^{N/(N-1)}}, \quad \text{em que } a_3, \alpha > 0 \quad \text{e} \quad r_3 > N - 1.$$

Eles usaram um método de aproximação para provar a existência da solução fraca $u \in W_0^{1,N}(\Omega)$ para o problema (2.36), sempre que $\gamma \in (0, \gamma^*)$, para algum $\gamma^* > 0$.

Notemos que (2.36) é um caso particular do problema (P), com $\lambda = \gamma a_1$, $\beta = \gamma a_2$, $q = r_1 + 1$, $a = 1$, $b = r_2$, $m = a_3$, $l = r_3 + 1$, e $s = \frac{N}{N-1}$.

Relembremos que o Corolário 2.3.2 estende o resultado obtido por de Araujo e Faria em [13] (para o caso $f(t) = a_3 t^{r_3} e^{\alpha t^{N/(N-1)}}$) já que admite $p \neq N$ e também permite que o termo de convecção seja multiplicado por uma potência da solução.

2.3.3 Aplicação 3

O seguinte corolário estende o resultado de Araujo e Faria apresentado no problema (2.36). Nesse problema, considerando o caso quando $f(t) = a_3 t^{r_3} e^{\alpha t^{N/(N-1)}}$, os autores impõem a condição $r_2 > N - 1$. No resultado seguinte admitimos $p < a + b$, na notação deles isto significa que $r_2 + 1 < N$.

Corolário 2.3.3. *Assumamos que $\partial\Omega \in C^{1,\tau}$ para algum $\tau \in (0, 1)$. Sejam $q, a, b, l, \alpha, s, \beta$ e m fixos, com $a, l \geq 1$; $\alpha, s \geq 0$ e $\beta, m > 0$. Suponhamos que*

$$1 \leq q < p < \min \{a + b, l\}.$$

Então, existe uma constante positiva M_p , tal que se

$$0 < \lambda \leq \lambda^* := \frac{M_p^{p-q}}{2A_p},$$

então (P) admite uma solução fraca $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ satisfazendo (2.5).

Demonstração. Agora, escrevamos a desigualdade (2.16) como

$$\varphi_1(M) + \varphi_2(M) \leq 1$$

em que

$$\varphi_1(t) := \lambda \frac{A_p}{t^{p-q}}, \quad t > 0$$

e

$$\varphi_2(t) := \beta B_p t^{(a+b)-p} + m A_p t^{l-p} e^{\alpha t^s}, \quad t > 0.$$

Devido às hipóteses, $(a+b)-p > 0$ e $l-p > 0$, daí temos que φ_2 é estritamente crescente e

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_2(t) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_2(t) = \infty.$$

Portanto, existe $M_p > 0$, tal que

$$\varphi_2(M_p) = \frac{1}{2}.$$

Assim, se $\lambda \leq \lambda^*$

$$\varphi_1(M_p) = \lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} \leq \left(\frac{M_p^{p-q}}{2A_p} \right) \frac{A_p}{M_p^{p-q}} = \frac{1}{2}$$

com isto, a desigualdade (2.16) é satisfeita com $M = M_p$. Consequentemente, podemos aplicar o Teorema 2.0.1 e obter o resultado desejado. $\square$

Na notação do problema (2.36) temos

$$\gamma \leq \gamma^* := \frac{M_p^{p-q}}{2a_1 A_p}$$

em que a constante M_p é definida pela equação

$$\gamma a_2 B_p M_p^{(a+b)-p} + m A_p M_p^{l-p} e^{\alpha M_p^s} = \frac{1}{2}.$$

2.3.4 Aplicação 4

Procedendo como nas duas provas anteriores, obtemos o seguinte resultado.

Corolário 2.3.4. *Suponha que $\partial\Omega \in C^{1,\tau}$ para algum $\tau \in (0, 1)$. Sejam q, a, b, l, α, s e β fixados, com $b, \beta > 0, a \geq 1, \alpha, s \geq 0$. Suponha, ainda, que*

$$1 \leq q < l = p < a + b.$$

Se

$$M_p := \left(\frac{1}{2\beta B_p} \right)^{\frac{1}{(a+b)-p}}$$

e

$$(\lambda, m) \in \mathcal{D} := \left\{ (\lambda, m) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ : \lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} + m A_p e^{\alpha M_p^s} \leq \frac{1}{2} \right\},$$

o problema (P) admite uma solução fraca $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ satisfazendo a desigualdade (2.5).

Demonstração. Da hipótese,

$$M_p := \left(\frac{1}{2\beta B_p} \right)^{\frac{1}{(a+b)-p}} \iff \beta = \frac{1}{2B_p M_p^{(a+b)-p}}.$$

Logo, como $(\lambda, m) \in \mathcal{D}$, temos

$$\begin{aligned} \lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} + \beta \frac{B_p}{M_p^{p-(a+b)}} + m \frac{A_p e^{\alpha M_p^s}}{M_p^{p-l}} &\leq \lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} + \left(\frac{1}{2B_p M_p^{(a+b)-p}} \right) \frac{B_p}{M_p^{p-(a+b)}} + m A_p e^{\alpha M_p^s} \\ &\leq \lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} + \frac{1}{2} + m A_p e^{\alpha M_p^s} \leq 1. \end{aligned}$$

Portanto, a desigualdade (2.16) é satisfeita e o resultado segue do Teorema 2.0.1. $\square$

Capítulo 3

Um resultado de não existência

Em [24, Theorem 2.1], Garcia Azorero e Peral Alonso provaram que o problema

$$\begin{cases} -\Delta_p u = me^u & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (3.1)$$

não tem uma solução se

$$m > \max \left\{ \lambda_p, \lambda_p \left(\frac{p-1}{e} \right)^{p-1} \right\}. \quad (3.2)$$

Nesta seção, estendemos o resultado de não existência de Garcia Azorero e Peral Alonso, para uma equação mais geral

$$-\Delta_p u = mu^{l-1}e^{\alpha u^s} + g(x), \text{ em } \Omega.$$

O lema seguinte foi provado por Allegretto e Huang (ver [2, Theorem 2.4]) como uma consequência da identidade de Picone.

Lema 3.0.1. *Seja $h \in L^\infty(\Omega)$ uma função não negativa. O problema de Dirichlet*

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda_p |u|^{p-2} u + h(x) & \text{em } \Omega, \\ u \geq 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

tem uma solução fraca se, e somente se, $h \equiv 0$ em Ω e $u = 0$ sobre $\partial\Omega$. Neste caso, a solução é um múltiplo de e_p .

Proposição 3.0.2. *Suponha que $u_m \in W_0^{1,p}(\Omega) \cap L^\infty(\Omega)$ seja uma solução fraca positiva do problema de Dirichlet*

$$\begin{cases} -\Delta_p u = mu^{l-1}e^{\alpha u^s} + g(x) & \text{em } \Omega, \\ u = 0, & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (3.3)$$

em que $g \in L^\infty(\Omega)$, $g \geq 0$, $1 \leq l < p$ e $\alpha, s > 0$. Então,

$$m < \lambda_p \left(\frac{p-l}{\alpha s e} \right)^{\frac{p-l}{s}}. \quad (3.4)$$

Demonstração. Consideremos, para $t > 0$, a função estritamente positiva

$$Q(t) := m \frac{e^{\alpha t^s}}{t^{p-l}}, \quad t > 0.$$

Logo,

$$Q'(t) = \frac{m e^{\alpha t^s} t^{p-l-1} (\alpha s t^s - (p-l))}{(t^{p-l})^2},$$

donde obtemos que o único ponto crítico de Q é

$$t_c = \left(\frac{p-l}{\alpha s} \right)^{1/s}.$$

Por hipótese temos, $p-l, \alpha, s > 0$, o que nos dá

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} Q(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} Q(t) = +\infty.$$

Disto, temos que t_c é o único ponto de mínimo global de $Q(t)$. Assim,

$$Q(t) > Q(t_c) = m \frac{e^{\alpha \left(\left(\frac{p-l}{\alpha s} \right)^{\frac{1}{s}} \right)^s}}{\left(\left(\frac{p-l}{\alpha s} \right)^{\frac{1}{s}} \right)^{p-l}} = m \frac{e^{\frac{p-l}{s}}}{\left(\frac{p-l}{\alpha s} \right)^{\frac{p-l}{s}}} = m \left(\frac{\alpha s e}{p-l} \right)^{\frac{p-l}{s}} = m C_p, \quad \forall t \neq t_c,$$

em que

$$C_p := \left(\frac{\alpha s e}{p-l} \right)^{\frac{p-l}{s}}.$$

Da definição da função Q decorre que

$$mu_m^{l-1} e^{\alpha u_m^s} = Q(u_m) u_m^{p-1} \geq Q(t_c) u_m^{p-1} = m C_p u_m^{p-1}, \quad \text{em } \Omega \quad (3.5)$$

em que a igualdade acontece apenas se $u_m = t_c$ ou $u_m = 0$.

Agora, como $u_m \in W_0^{1,p}(\Omega)$ é uma solução positiva, podemos escrever o problema (3.3) como

$$-\Delta_p u_m = \lambda_p u_m^{p-1} + h, \text{ em } \Omega \quad (3.6)$$

em que

$$h := m u_m^{l-1} e^{\alpha u_m^s} + g - \lambda_p u_m^{p-1}.$$

Mais ainda, temos que a função $h \in L^\infty(\Omega)$, pois $u_m, g \in L^\infty(\Omega)$. Lembrando que $g \geq 0$, da desigualdade (3.5) obtemos

$$h \geq m u_m^{l-1} e^{\alpha u_m^s} - \lambda_p u_m^{p-1} \geq (mC_p - \lambda_p) u_m^{p-1}. \quad (3.7)$$

Para obter o resultado, provaremos que

$$mC_p - \lambda_p < 0,$$

que é a desigualdade dada em (3.4), considerando a constante $C_p = \left(\frac{\alpha s e}{p-l}\right)^{\frac{p-l}{s}}$. Suponhamos, por contradição, que

$$mC_p \geq \lambda_p.$$

Devido a esta suposição, temos que $h \geq 0$ na expressão (3.7). Portanto, na igualdade (3.6) são satisfeitas as condições do Lema 3.0.1, o que garante que $h \equiv 0$, q.t.p. em Ω .

Assim,

$$0 \leq (mC_p - \lambda_p) u_m^{p-1} \leq m u_m^{l-1} e^{\alpha u_m^s} + g - \lambda_p u_m^{p-1} = 0. \quad (3.8)$$

Portanto, temos duas possibilidades a serem consideradas:

Se $mC_p > \lambda_p$, então da expressão (3.8) temos

$$u_m = 0, \quad \text{q.t.p. em } \Omega,$$

o que é um absurdo, pois $u_m > 0$.

Se $mC_p = \lambda_p$, da desigualdade (3.5) temos $\lambda_p u_m^{p-1} \leq m u_m^{l-1} e^{\alpha u_m^s}$ e pela expressão (3.8)

conseguimos

$$g = \lambda_p u_m^{p-1} - m u_m^{l-1} e^{\alpha u_m^s} \leq 0.$$

Isto implica que $g = 0$, daí $\lambda_p u_m^{p-1} = m u_m^{l-1} e^{\alpha u_m^s}$. Além disso, como estamos considerando $m C_p = \lambda_p$, obtemos a igualdade na expressão (3.5) e esta igualdade nos dá

$$u_m = t_c, \quad \text{q.t.p. em } \Omega,$$

que é uma contradição, pois t_c não é solução de (3.3).

Assim, concluímos que

$$m C_p - \lambda_p < 0 \iff m < \frac{\lambda_p}{C_p} = \lambda_p \left(\frac{p-l}{\alpha s e} \right)^{\frac{p-l}{s}}.$$

□

Notemos que a Proposição 3.0.2 diz que o problema dado em (3.3) não tem solução se

$$m \geq \lambda_p \left(\frac{p-l}{\alpha s e} \right)^{\frac{p-l}{s}}.$$

Além disso, esta proposição refina o resultado dado por Garcia Azorero e Peral Alonso [24, Theorem 2.1], pois se no problema (3.3) consideramos $l = \alpha = s = 1$ e $g \equiv 0$, obtemos que o problema (3.1) não tem solução se

$$m \geq \lambda_p \left(\frac{p-1}{e} \right)^{p-1},$$

o que melhora a condição dada em (3.2).

Também, observemos que a desigualdade (3.4) melhora a estimativa dada em (3.2) quando $1 < p \leq 1 + e$. De fato, neste caso, (3.1) também não tem solução se

$$\lambda_p \left(\frac{p-1}{e} \right)^{p-1} \leq m \leq \lambda_p.$$

Capítulo 4

Comportamento assintótico

Nesta seção, assumiremos uma hipótese forte na regularidade de Ω : ou $\partial\Omega \in C^{1,1}$ ou Ω é convexo e $\partial\Omega \in C^{1,\tau}$, com $\tau \in (0, 1)$.

Nosso objetivo é provar a convergência uniforme da sequência (u_p) à função distância d_Ω , quando $p \rightarrow \infty$, em que $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ é a solução do problema (P) , dada pelo Corolário 2.3.1.

Para isto, consideremos: $p > \max\{q, a + b, l\}$, os parâmetros positivos λ e β arbitrários, porém fixados, e o parâmetro m restrito ao intervalo $(0, m_p]$. Recordemos que m_p foi dada na expressão (2.31):

$$m_p := \frac{M_p^{p-l}}{2A_p e^{\alpha M_p^s}},$$

em que a constante positiva M_p foi definida na igualdade (2.30) e satisfaz

$$\left(\frac{\lambda}{\lambda_p}\right)^{1/(p-q)} e_p \leq u_p \leq \frac{M_p}{\|\phi_p\|_\infty} \phi_p \quad \text{e} \quad \|\nabla u_p\|_\infty \leq \frac{k_p M_p}{\|\phi_p\|_\infty}. \quad (4.1)$$

Para obter nosso objetivo, faremos uso de estimativas explícitas do gradiente, devido a Ercole em [18]. Estas estimativas são baseadas em um resultado de Cianchi e Maz'ya, em [11] para uma classe de operadores que incluem, como um caso particular, o operador p -Laplaciano.

4.1 Resultados de convergência e estimativas

Antes de enunciarmos o resultado que nos ajudará em obtermos as estimativas do gradiente, vejamos uma outra estimativa para uma função $g \in L^\infty(\Omega)$ que envolve a norma do

espaço de Lorentz, definida na Seção 1.6.

Dada $g \in L^\infty(\Omega)$ e considerando $p = N$ e $q = 1$ na Definição 1.6.13, em que $N' = \frac{N}{N-1}$, temos

$$\begin{aligned} \|g\|_{N,1} &= \int_0^{|\Omega|} |g^{**}(s)| s^{-\frac{1}{N'}} ds = \int_0^{|\Omega|} \left| \frac{1}{s} \int_0^s g^*(r) dr \right| s^{-\frac{1}{N'}} ds \\ &\leq \|g^*\|_\infty \int_0^{|\Omega|} \left| \frac{1}{s} \int_0^s dr \right| s^{-\frac{1}{N'}} ds = \|g^*\|_\infty \int_0^{|\Omega|} s^{-\frac{1}{N'}} ds \\ &= \|g^*\|_\infty \int_0^{|\Omega|} s^{\frac{1}{N}-1} ds = N |\Omega|^{\frac{1}{N}} \|g\|_\infty, \end{aligned} \quad (4.2)$$

a última igualdade decorrendo de $\|g^*\|_\infty = \|g\|_\infty$, conforme (1.9).

Lema 4.1.1. *Suponha que $p \geq 2$ e, ou $\partial\Omega \in C^{1,1}$ ou Ω é convexo. Seja $v \in W_0^{1,p}(\Omega)$ a solução fraca do problema do Dirichlet*

$$\begin{cases} -\Delta_p v = g & \text{em } \Omega, \\ v = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

em que $g \in L^\infty(\Omega)$. Existem constantes positivas c e γ , as quais são uniformes com respeito a p e à função g , tais que

$$\|\nabla v\|_\infty^{p-1} \leq cp^\gamma \|g\|_\infty. \quad (4.3)$$

Demonstração. Na prova deste lema, consideraremos os casos $N = 2$ e $N \geq 3$.

No caso $N = 2$: Consideremos $\partial\Omega \in C^{1,1}$. Devido a $C^{1,1} \subset W^2L^{\theta,1}$, resulta que $\partial\Omega \in W^2L^{\theta,1}$, para algum $\theta > 1$. Além disso, $g \in L^\infty(\Omega) \subset L^q(\Omega)$, para algum $q > 2$. Então, invocando [18, Teorema 1.3], existe uma constante C positiva que depende no máximo de q e Ω , tal que

$$\|\nabla v\|_\infty^{p-1} \leq C p^{\frac{5}{2} + \frac{2\theta}{\theta-1}} \|g\|_q. \quad (4.4)$$

Além disso, como $\|g\|_q \leq \|g\|_\infty |\Omega|^{1/q}$, podemos definir $c := C |\Omega|^{1/q}$ e $\gamma := \frac{5}{2} + \frac{2\theta}{\theta-1}$, dessa maneira, obtemos o resultado.

Agora, consideremos Ω convexo. Do [18, Teorema 1.3], a estimativa (4.4) escreve-se

como

$$\|\nabla v\|_\infty^{p-1} \leq C p^{\frac{5}{2}} \|g\|_q,$$

e é suficiente definir $c := C |\Omega|^{1/q}$ e $\gamma := \frac{5}{2}$.

Caso $N \geq 3$: Se $\partial\Omega \in C^{1,1}$, analogamente ao caso anterior, obtemos que $\partial\Omega \in W^2L^{\theta,1}$, para algum $\theta > 1$. Além disso, a expressão (4.2) obtemos que $g \in L^{N,1}(\Omega)$. Portanto, do [18, Teorema 1.2] e (4.2) conseguimos

$$\|\nabla v\|_\infty^{p-1} \leq C p^{\frac{5}{2} + \frac{\theta N}{\theta - (N-1)}} \|g\|_{N,1} \leq C p^{\frac{5}{2} + \frac{\theta N}{\theta - (N-1)}} N |\Omega|^{\frac{1}{N}} \|g\|_\infty, \quad (4.5)$$

e, definindo as constantes $c := CN |\Omega|^{\frac{1}{N}}$ e $\gamma := \frac{5}{2} + \frac{\theta N}{\theta - (N-1)}$, obtemos o resultado.

Agora, se a hipótese $\partial\Omega \in W^2L^{\theta,1}$ for substituída por Ω ser convexo, então devido a [18, Teorema 1.2], temos

$$\|\nabla v\|_\infty^{p-1} \leq C p^{\frac{5}{2}} \|g\|_{N,1}.$$

Procedendo analogamente, podemos utilizar a desigualdade (4.2) e tomar as constantes $c := CN |\Omega|^{\frac{1}{N}}$ e $\gamma := \frac{5}{2}$ para obter

$$\|\nabla v\|_\infty^{p-1} \leq c p^\gamma \|g\|_\infty.$$

□

Observação 4.1.2. Seguindo Cianchi e Maz'ya em [11], a suposição $\partial\Omega \in W^2L^{\theta,1}$ significa que Ω é localmente o subgráfico de uma função de $N - 1$ variáveis, cujas derivadas distribucionais de segunda ordem encontram-se no espaço de Lorentz $L^{\theta,1}$. A hipótese de regularidade, isto é, $\partial\Omega \in W^2L^{N-1,1}$ é a suposição de integrabilidade mais fraca possível sobre derivadas de segunda ordem para que as derivadas de primeira ordem sejam contínuas e, portanto, para que $\partial\Omega \in C^{1,0}$ [10].

Graças ao Lema 4.1.1, podemos enunciar e provar o próximo resultado, que será crucial para demonstrar a convergência uniforme da família de soluções (u_p) do problema (P).

Proposição 4.1.3. *Seja $k_p := \sup_{w \in \mathcal{S}_p} \|\nabla w\|_\infty$, como definido em (2.1). Vale*

$$\lim_{p \rightarrow \infty} k_p = 1. \quad (4.6)$$

Demonstração. Observemos que da desigualdade (2.11) decorre

$$\frac{\|\phi_p\|_\infty}{\|d_\Omega\|_\infty} \leq k_p, \text{ sempre que } p > 1,$$

e assim, pelo Teorema 1.5.1, segue-se que

$$1 = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{\|\phi_p\|_\infty}{\|d_\Omega\|_\infty} \leq \liminf_{p \rightarrow \infty} k_p. \quad (4.7)$$

De acordo com o Lema 4.1.1 temos

$$\|\nabla w\|_\infty \leq (cp^\gamma)^{\frac{1}{p-1}}, \text{ para todo } w \in \mathcal{S}_p, p \geq 2.$$

Consequentemente, devido à definição de k_p , dada em (2.1), concluímos que

$$k_p \leq (cp^\gamma)^{\frac{1}{p-1}}, \text{ para todo } p \geq 2.$$

Portanto, na expressão anterior, tomando o limite quando $p \rightarrow \infty$ e aplicando L'Hopital, segue-se que

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} k_p \leq \lim_{p \rightarrow \infty} (cp^\gamma)^{\frac{1}{p-1}} = \lim_{p \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(cp^\gamma)}{p-1}} = \lim_{p \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(cp^\gamma)}{p-1}} = e^{\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{\gamma}{p}} = 1. \quad (4.8)$$

Assim, das desigualdades (4.7) e (4.8), obtemos

$$\lim_{p \rightarrow \infty} k_p = 1.$$

□

No próximo lema, as expressões M_p e m_p estão definidas no Corolário 2.3.1. Para comodidade do leitor vamos recordar estas definições: M_p é definida pela igualdade

$$\lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} + \beta \frac{B_p}{M_p^{p-(a+b)}} = \frac{1}{2}$$

enquanto m_p é dada por

$$m_p := \frac{M_p^{p-l}}{2A_p e^{\alpha M_p^s}}.$$

Lema 4.1.4. *As seguintes convergências são satisfeitas:*

1. $\lim_{p \rightarrow \infty} M_p = \|d_\Omega\|_\infty$,
2. $\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^p = \frac{1}{2(\lambda \|d_\Omega\|_\infty^{q-1} + \beta \|d_\Omega\|_\infty^{a-1})}$,
3. $\lim_{p \rightarrow \infty} m_p = m_\infty$, em que

$$m_\infty := (\lambda \|d_\Omega\|_\infty^{q-1} + \beta \|d_\Omega\|_\infty^{a-1}) \|d_\Omega\|_\infty^{l-1} e^{-\alpha \|d_\Omega\|_\infty^s}. \quad (4.9)$$

Demonstração. Recordemos que $A_p = \|\phi_p\|_\infty^{p-1}$ e $B_p = k_p^b \|\phi_p\|_\infty^{p-1-b}$.

Prova do item 1. Das definições de A_p e B_p podemos escrever a igualdade (2.30) como

$$\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1} \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^{p-q} + \beta \|\phi_p\|_\infty^{a-1} k_p^b \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^{p-r} = \frac{1}{2}, \quad (4.10)$$

em que

$$r := a + b.$$

Logo, de (4.10) decorre

$$\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1} \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^{p-q} \leq \frac{1}{2} \iff \frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \leq \frac{1}{(2\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1})^{1/(p-q)}}. \quad (4.11)$$

Agora, analisando a convergência do lado direito da expressão (4.11), obtemos

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{(2\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1})^{1/(p-q)}} = \frac{1}{\lim_{p \rightarrow \infty} (2\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1})^{1/(p-q)}} = \frac{1}{(2\lambda \|d_\Omega\|_\infty^{q-1})^0} = 1,$$

onde aplicamos o Teorema 1.5.1 para obter

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|\phi_p\|_\infty = \|d_\Omega\|_\infty. \quad (4.12)$$

Portanto, da desigualdade (4.11) obtemos

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \leq \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{(2\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1})^{1/(p-q)}} = 1. \quad (4.13)$$

Para concluir a prova do item 1 vamos mostrar que

$$1 \leq \liminf_{p \rightarrow \infty} \frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p}.$$

Sem perda de generalidade, analisaremos o caso em que $r \geq q$ (o caso $r < q$ é análogo).

Da desigualdade (4.13), temos que $\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \leq 1$. Assim, como $r \geq q$, temos

$$\left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^{p-q} \leq \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^{p-r}$$

para todo p suficientemente grande. Substituindo esta última desigualdade na expressão (4.10), temos

$$\frac{1}{2} \leq (\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1} + \beta \|\phi_p\|_\infty^{a-1} k_p^b) \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^{p-r},$$

donde concluímos

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{p-r}} (\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1} + \beta \|\phi_p\|_\infty^{a-1} k_p^b)^{-\frac{1}{p-r}} \leq \frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p}$$

para todo p suficientemente grande. Logo, usando as expressões (4.6), (4.12) e fazendo $p \rightarrow \infty$ na desigualdade anterior, obtemos

$$1 = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{p-r}} (\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1} + \beta \|\phi_p\|_\infty^{a-1} k_p^b)^{-\frac{1}{p-r}} \right) \leq \liminf_{p \rightarrow \infty} \frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p},$$

e assim obtemos

$$1 \leq \liminf_{p \rightarrow \infty} \frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p}. \quad (4.14)$$

Combinando as desigualdades (4.13) e (4.14), concluímos que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} = 1. \quad (4.15)$$

Logo, tendo em vista (4.12), obtemos o item 1.

Prova do item 2. Definamos o seguinte limite por

$$L := \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^p.$$

Reescrevendo e aplicando passando ao limite na expressão (4.10), vem

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\lambda \|\phi_p\|_\infty^{q-1} \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^p \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^{-q} + \beta \|\phi_p\|_\infty^{a-1} k_p^b \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^p \left(\frac{\|\phi_p\|_\infty}{M_p} \right)^{-r} \right) = \frac{1}{2}.$$

Assim, de (4.6), (4.12), (4.15) e L , obtemos a igualdade

$$\lambda \|d_\Omega\|_\infty^{q-1} L + \beta \|d_\Omega\|_\infty^{a-1} L = \frac{1}{2} \iff L = \frac{1}{2(\lambda \|d_\Omega\|_\infty^{q-1} + \beta \|d_\Omega\|_\infty^{a-1})},$$

o que prova o item 2.

Prova do item 3. Das definições de m_p , A_p , e usando os itens 1 e 2, temos

$$\begin{aligned} \lim_{p \rightarrow \infty} m_p &= \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{M_p^{p-l}}{2A_p e^{\alpha M_p^s}} = \frac{1}{2} \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{M_p}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^p \left(\frac{M_p}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^{-1} M_p^{1-l} \frac{1}{e^{\alpha M_p^s}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{L} \|d_\Omega\|_\infty^{1-l} \frac{1}{e^{\alpha \|d_\Omega\|_\infty^s}} \\ &= \frac{1}{2} 2(\lambda \|d_\Omega\|_\infty^{q-1} + \beta \|d_\Omega\|_\infty^{a-1}) \|d_\Omega\|_\infty^{1-l} e^{-\alpha \|d_\Omega\|_\infty^s} = m_\infty. \end{aligned}$$

□

O próximo lema está contido em [26] e uma prova detalhada pode ser consultada em [20, Lemma 4.2].

Lema 4.1.5. *Para cada $p > N$, seja u_p uma função não negativa em $W_0^{1,p}(\Omega)$. Suponhamos que*

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p \leq C, \quad (4.16)$$

para alguma constante C . Se $p_n \rightarrow \infty$, então existem uma subsequência $(u_{p_{n_j}})$ e uma função $u_\infty \in W_0^{1,\infty}(\Omega) \cap C_0(\bar{\Omega})$, tais que $u_{p_{n_j}} \rightarrow u_\infty$ uniformemente em $\bar{\Omega}$. Além disso,

$$\|\nabla u_\infty\|_\infty \leq C \quad e \quad 0 \leq u_\infty \leq C d_\Omega, \quad \text{em } \bar{\Omega}.$$

4.2 Convergência uniforme para d_Ω

A Proposição 4.1.3 e os Lemas 4.1.4 e 4.1.5 nos garantem que, a menos de subsequências, u_p converge uniformemente para uma função u_∞ em $\bar{\Omega}$, quando $p \rightarrow \infty$. Com efeito, tomando a desigualdade da direita na expressão (4.1) e usando as convergências dadas em (4.6) e no Lema 4.1.4, obtemos a seguinte estimativa assintótica para $\|\nabla u_p\|_p$:

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p \leq \limsup_{p \rightarrow \infty} |\Omega|^{\frac{1}{p}} \|\nabla u_p\|_\infty \leq \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{|\Omega|^{\frac{1}{p}} k_p M_p}{\|\phi_p\|_\infty} = 1, \quad \text{em } \bar{\Omega}. \quad (4.17)$$

Logo, pelo Lema 4.1.5, existe uma subsequência $(u_{p_{n_j}})$ a qual converge uniformemente para uma função $u_\infty \in W^{1,\infty}(\Omega) \cap C_0(\bar{\Omega})$ em $\bar{\Omega}$ e a menos de subsequências

$$\lim_{p \rightarrow \infty} u_p = u_\infty, \quad \text{uniformemente em } \bar{\Omega}. \quad (4.18)$$

Além disso,

$$\|\nabla u_\infty\|_\infty \leq 1 \quad \text{e} \quad 0 \leq u_\infty \leq d_\Omega, \quad \text{em } \bar{\Omega}. \quad (4.19)$$

Na sequência, vamos mostrar que $u_\infty = d_\Omega$. É interessante observarmos que as informações e resultados que temos até agora nos levam às seguintes estimativas para u_∞ :

$$\|d_\Omega\|_\infty e_\infty \leq u_\infty \leq d_\Omega, \quad (4.20)$$

em que e_∞ é a função limite dada pelo Teorema 1.4.2. De fato, combinando as estimativas para u_p em (4.1), com o item 1 do Lema 4.1.4, o Lema 1.4.1 e o Teorema 1.4.2 obtemos (4.20).

Portanto, já podemos concluir de (4.20) e da Observação 1.4.3 que a igualdade $u_\infty = d_\Omega$ ocorre para domínios simples como bolas, anéis e estádios, uma vez que $e_\infty = \frac{d_\Omega}{\|d_\Omega\|_\infty}$ para estes domínios.

Entretanto, para outros domínios simples, como quadrados, triângulos e outros polígonos, ainda não podemos garantir a igualdade $u_\infty = d_\Omega$, pois para estes domínios temos $e_\infty \neq \frac{d_\Omega}{\|d_\Omega\|_\infty}$.

Proposição 4.2.1. *Assuma que $\partial\Omega \in C^{1,1}$. Sejam q, a, b, l, λ e β fixos, com $q > 1$, $a, l \geq 1$, $e, b, s, \alpha, \lambda, \beta > 0$. Para cada $p > \max\{q, a + b, l\}$, sejam M_p, m_p e $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ como no Corolário 2.3.1. Então,*

$$\lim_{p \rightarrow \infty} u_p = d_\Omega, \text{ uniformemente em } \bar{\Omega}.$$

Demonstração. Para obter o resultado, provaremos que $u_\infty = d_\Omega$.

Da expressão (4.18) temos que, a menos de subsequências, u_p converge uniformemente para a função $u_\infty \in W^{1,\infty}(\Omega) \cap C_0(\bar{\Omega})$ em $\bar{\Omega}$, satisfazendo a desigualdade (4.19). Além disso, recordemos de (2.19) que u_p também é solução fraca do problema de Dirichlet,

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda |u|^{q-2} u + h_p & \text{em } \Omega, \\ u > 0 & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega; \end{cases} \quad (4.21)$$

em que

$$h_p := \beta u_p^{a-1} |\nabla u_p|^b + m u_p^{l-1} e^{\alpha u_p^s}.$$

Da desigualdade (4.1), sabemos que $0 \leq u_p \leq M_p$ e $\|\nabla u_p\|_\infty \leq \frac{k_p M_p}{\|\phi_p\|_\infty}$. Logo,

$$0 \leq \|h_p\|_\infty \leq \beta M_p^{a-1} \left(\frac{k_p M_p}{\|\phi_p\|_\infty} \right)^b + m M_p^{l-1} e^{\alpha M_p^s} < \infty.$$

Da convergência em (4.15), do Lema 4.1.4, item 1, e da Proposição 4.1.3, obtemos

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \|h_p\|_\infty \leq \beta \|d_\Omega\|_\infty^{a-1} + m \|d_\Omega\|_\infty^{l-1} e^{\alpha \|d_\Omega\|_\infty^s} < \infty. \quad (4.22)$$

Seja

$$I_p(v) := \frac{1}{p} \|\nabla v\|_p^p - \frac{1}{q} \int_\Omega |v|^q dx - \int_\Omega h_p v dx, \quad v \in W_0^{1,p}(\Omega),$$

o funcional energia associado ao problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda |u|^{q-2} u + h_p & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (4.23)$$

Este funcional é de classe C^1 e assume valores não negativos. Além disso, ele é limitado

inferiormente e coercivo, isto é

$$-\infty < \inf_{u \in W_0^{1,p}(\Omega)} I_p(u)$$

e

$$\lim_{\|\nabla u\|_p \rightarrow \infty} \frac{I_p(u)}{\|\nabla u\|_p} = \infty.$$

Portanto, um método de minimização direta padrão garante a existência de um minimizador global v_p para I_p que não é a função nula.

Tal minimizador v_p é não negativo (note que $I_p(|v_p|) \leq I_p(v_p)$). Naturalmente, v_p é um ponto crítico de I_p e, conseqüentemente, v_p é uma solução fraca não negativa e não trivial de (4.23). Pelo princípio do máximo forte, temos $v_p > 0$ em Ω . Portanto, v_p é uma solução fraca de (4.21). Da unicidade de soluções para este problema (veja o Corolário E.0.2), segue-se que $v_p = u_p$.

Das propriedades da função distância d_Ω , dadas em (1.1), temos que $d_\Omega \in W_0^{1,p}(\Omega)$. Daí, $I_p(u_p) \leq I_p(d_\Omega)$, ou seja,

$$I_p(u_p) \leq \frac{1}{p} \int_\Omega |\nabla d_\Omega|^p dx - \frac{1}{q} \int_\Omega d_\Omega^q dx - \int_\Omega h_p d_\Omega dx.$$

Novamente, segue das propriedades dadas em (1.1) que $|\nabla d_\Omega| = 1$ q.t.p. em Ω . Assim, da desigualdade anterior temos

$$\frac{1}{q} \int_\Omega (d_\Omega^q - u_p^q) dx + \int_\Omega h_p (d_\Omega - u_p) dx \leq \frac{|\Omega|}{p} - \frac{1}{p} \|\nabla u_p\|_p^p \leq \frac{|\Omega|}{p}. \quad (4.24)$$

Portanto, de (4.24) decorre que

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{q} \int_\Omega (d_\Omega^q - u_p^q) dx + \int_\Omega h_p (d_\Omega - u_p) dx \right] \leq 0. \quad (4.25)$$

Na sequência, provaremos que

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{q} \int_\Omega (d_\Omega^q - u_p^q) dx + \int_\Omega h_p (d_\Omega - u_p) dx \right] \geq 0.$$

Da expressão (4.19) temos que $d_\Omega - u_\infty \geq 0$. Então, a convergência uniforme de u_p para

u_∞ implica que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (d_\Omega^q - u_p^q) dx = \int_{\Omega} (d_\Omega^q - u_\infty^q) dx \geq 0. \quad (4.26)$$

Uma vez que $d_\Omega - u_\infty \geq 0$, temos

$$\int_{\Omega} h_p(d_\Omega - u_p) dx = \int_{\Omega} h_p(d_\Omega - u_\infty) dx + \int_{\Omega} h_p(u_\infty - u_p) dx \geq \int_{\Omega} h_p(u_\infty - u_p) dx.$$

Daí,

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \int_{\Omega} h_p(d_\Omega - u_p) dx \geq \liminf_{p \rightarrow \infty} \int_{\Omega} h_p(u_\infty - u_p) dx. \quad (4.27)$$

Devido à convergência uniforme de u_p para u_∞ , combinando com (4.22), conseguimos que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \int_{\Omega} h_p(u_\infty - u_p) dx = 0, \quad (4.28)$$

pois

$$\left| \int_{\Omega} h_p(u_\infty - u_p) dx \right| \leq \|u_\infty - u_p\|_\infty \|h_p\|_\infty |\Omega|.$$

Assim, das desigualdade dadas em (4.27) e (4.28), temos que

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \int_{\Omega} h_p(d_\Omega - u_p) dx \geq 0. \quad (4.29)$$

Portanto, de (4.26) e de (4.29),

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{q} \int_{\Omega} (d_\Omega^q - u_p^q) dx + \int_{\Omega} h_p(d_\Omega - u_p) dx \right] \geq 0. \quad (4.30)$$

Combinando as desigualdades (4.25) e (4.30) obtemos

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{q} \int_{\Omega} (d_\Omega^q - u_p^q) dx + \int_{\Omega} h_p(d_\Omega - u_p) dx \right] = 0.$$

Levando em conta as expressões (4.26) e (4.29) decorre que

$$\begin{aligned}
0 &= \lim_{p \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{q} \int_{\Omega} (d_\Omega^q - u_p^q) dx + \int_{\Omega} h_p(d_\Omega - u_p) dx \right] \\
&= \liminf_{p \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{q} \int_{\Omega} (d_\Omega^q - u_p^q) dx + \int_{\Omega} h_p(d_\Omega - u_p) dx \right] \\
&\geq \liminf_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{q} \int_{\Omega} (d_\Omega^q - u_p^q) dx + \liminf_{p \rightarrow \infty} \int_{\Omega} h_p(d_\Omega - u_p) dx \\
&\geq \frac{1}{q} \int_{\Omega} (d_\Omega^q - u_\infty^q) dx \geq 0.
\end{aligned}$$

Isto é,

$$\frac{1}{q} \int_{\Omega} (d_\Omega^q - u_\infty^q) dx = 0.$$

Portanto, lembrando mais uma vez que $u_\infty \leq d_\Omega$, concluímos que $u_\infty = d_\Omega$.

Observando que o limite é sempre d_Ω , concluímos que u_p converge uniformemente para d_Ω em $\bar{\Omega}$ (independentemente de subsequências). $\square$

Agora estamos em condições de enunciar e provar o resultado principal desta seção. Enfim daremos a prova do problema do comportamento assintótico da solução u_p do problema (P).

Teorema 4.2.2. *Assuma que $\partial\Omega \in C^{1,1}$. Sejam λ e β arbitrários, porém números reais positivos fixos, e seja m tal que*

$$0 < m < m_\infty. \quad (4.31)$$

Existe $p_0 > \max\{q, a + b, l\}$ tal que, se $p > p_0$, então o problema de Dirichlet (P) admite uma solução fraca $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$. Além disso,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} u_p = d_\Omega \text{ uniformemente em } \bar{\Omega}. \quad (4.32)$$

Demonstração: Da hipótese, $q, a + b, l$ são fixos e como $\lim_{p \rightarrow \infty} m_p = m_\infty$, então

$$\exists p_0 > \max\{q, a + b, l\}, \quad \text{tal que} \quad 0 < m < m_p, \quad \forall p > p_0. \quad (4.33)$$

A expressão (4.33) juntamente com o fato que $C^{1,1} \subset C^{1,\tau}$ garantem que as hipóteses do

Corolário 2.3.1 são satisfeitas. Portanto, existem $M_p > 0$ e $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$, tais que

$$\lambda \frac{A_p}{M_p^{p-q}} + \beta \frac{B_p}{M_p^{p-(a+b)}} = \frac{1}{2} \quad (4.34)$$

e

$$\left(\frac{\lambda}{\lambda_p}\right)^{1/(p-q)} e_p \leq u_p \leq \frac{M_p}{\|\phi_p\|_\infty} \phi_p \quad \text{e} \quad \|\nabla u_p\|_\infty \leq \frac{k_p M_p}{\|\phi_p\|_\infty}.$$

Mais ainda, vemos que as expressões (4.33) e (4.34) satisfazem as hipóteses da Proposição 4.2.1, de onde temos que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} u_p = d_\Omega, \text{ uniformemente em } \overline{\Omega}.$$

□

Capítulo 5

Comportamento limite de soluções do problema de Dirichlet envolvendo o p -Laplaciano e um termo de convecção com expoente dependendo de p

Neste capítulo, vamos estudar o comportamento assintótico, quando $p \rightarrow \infty$, de uma solução positiva u_p do problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda |u|^{q-2} u + \mu |u|^{a-2} u |\nabla u|^{p-a} & \text{em } \Omega, \\ u = 0, & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (A)$$

em que Ω é um domínio Lipschitz limitado de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 2$, e $q, a \geq 1$.

Sem perda de generalidade, vamos considerar $\lambda = 1$ (veja a Observação 5.2.1). Considerando (u_p) uma família arbitrária de soluções fracas positivas do problema (A), provaremos que u_p converge uniformemente à função distância até a fronteira d_Ω , quando $p \rightarrow \infty$, sempre que $0 < \mu < \|d_\Omega\|_\infty^{-a}$.

Definição 5.0.1. Dizemos que $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ é uma **solução fraca** do problema de Dirichlet (A), se

$$\int_\Omega |\nabla u_p|^{p-2} \nabla u_p \nabla v \, dx = \int_\Omega |u_p|^{q-2} u_p v \, dx + \mu \int_\Omega |u_p|^{a-2} u_p v |\nabla u_p|^{p-a} \, dx, \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

Para μ suficientemente pequeno, o problema (A) tem pelo menos uma solução fraca positiva u_p tal que $|\nabla u_p| \in L^\infty(\Omega)$ (veja [9]).

O principal resultado deste capítulo tem o seguinte enunciado.

Teorema 5.0.2. *Suponha que para algum μ satisfazendo*

$$0 < \mu < \|d_\Omega\|_\infty^{-a} \quad (5.1)$$

e para todo p suficientemente grande, o problema (A) tenha uma solução fraca positiva $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ tal que $|\nabla u_p| \in L^\infty(\Omega)$. Então,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} u_p = d_\Omega, \text{ uniformemente em } \bar{\Omega}. \quad (5.2)$$

A demonstração deste resultado de convergência será desenvolvida ao longo das seções seguintes. Enfatizamos que tal resultado é válido para qualquer família de soluções para o problema (A) com gradiente limitado. Acreditamos que isto é relevante, uma vez que unicidade de soluções para este problema não é conhecida na literatura.

5.1 Estimativas assintóticas

Da definição do primeiro autovalor do p -Laplaciano λ_p , dada em (1.6), temos a seguinte desigualdade de imersão,

$$\|u_p\|_p \leq \lambda_p^{-\frac{1}{p}} \|\nabla u_p\|_p. \quad (5.3)$$

Tomando $v = u_p$ na Definição 5.0.1 obtemos

$$\|\nabla u_p\|_p^p = \|u_p\|_q^q + \mu \int_\Omega |u_p|^a |\nabla u_p|^{p-a} dx. \quad (5.4)$$

Vamos estimar a integral que aparece na última igualdade. Para isto consideremos

$$\tilde{p} = \frac{p}{a} \quad \text{e} \quad \tilde{q} = \frac{p}{p-a}, \quad \text{em que} \quad \frac{1}{\tilde{p}} + \frac{1}{\tilde{q}} = 1.$$

Da desigualdade de Hölder e do Teorema B.0.1, obtemos

$$\int_{\Omega} |u_p|^a |\nabla u_p|^{p-a} dx \leq \left(\int_{\Omega} (|u_p|^a)^{\frac{p}{a}} dx \right)^{\frac{a}{p}} \left(\int_{\Omega} (|\nabla u_p|^{p-a})^{\frac{p}{p-a}} dx \right)^{\frac{p-a}{p}} = \|u_p\|_p^a \|\nabla u_p\|_p^{p-a}.$$

Para estimar o termo à direita da igualdade acima usamos a desigualdade de imersão dada em (5.3). Assim, temos

$$\int_{\Omega} |u_p|^a |\nabla u_p|^{p-a} dx \leq \lambda_p^{-\frac{a}{p}} \|\nabla u_p\|_p^a \|\nabla u_p\|_p^{p-a} = \lambda_p^{-\frac{a}{p}} \|\nabla u_p\|_p^p. \quad (5.5)$$

Substituindo a expressão (5.5) na expressão (5.4), obtemos

$$\|\nabla u_p\|_p^p \leq \|u_p\|_q^q + \mu \lambda_p^{-\frac{a}{p}} \|\nabla u_p\|_p^p.$$

Mais ainda, para $q \leq p$, na Proposição B.0.3, temos que $\|u\|_q^q \leq |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \|u\|_p^q$ e, substituindo este resultado na desigualdade anterior, concluímos que

$$\|\nabla u_p\|_p^p \leq |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \|u\|_p^q + \mu \lambda_p^{-\frac{a}{p}} \|\nabla u_p\|_p^p.$$

Aplicando novamente a desigualdade de imersão (5.3) temos que

$$\|\nabla u_p\|_p^p \leq |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \lambda_p^{-\frac{q}{p}} \|\nabla u_p\|_p^q + \mu \lambda_p^{-\frac{a}{p}} \|\nabla u_p\|_p^p, \quad (5.6)$$

que é equivalente à seguinte estimativa a priori

$$1 \leq \mu \lambda_p^{-\frac{a}{p}} + \frac{|\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \lambda_p^{-\frac{q}{p}}}{\|\nabla u_p\|_p^{p-q}}. \quad (5.7)$$

Afirmção 5.1.1. *Se $0 < \mu < \|d_{\Omega}\|_{\infty}^{-a}$, então*

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p \leq 1.$$

Demonstração. A prova desta afirmação será feita por absurdo. Suponhamos que existam $L > 1$ e $p_0 > 1$ tais que

$$\|\nabla u_p\|_p \geq L, \text{ para todo } p > p_0. \quad (5.8)$$

Do Lema 1.4.1, obtemos

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \lambda_p^{-1/p} = \|d_\Omega\|_\infty. \quad (5.9)$$

Disto, da expressão (5.8) e tomando limite em ambos os lados na desigualdade (5.7), segue-se que

$$1 \leq \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\mu \lambda_p^{-\frac{a}{p}} + \frac{|\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \lambda_p^{-\frac{q}{p}}}{\|\nabla u_p\|_p^{p-q}} \right) \leq \mu \|d_\Omega\|_\infty^a + \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{|\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \lambda_p^{-\frac{q}{p}}}{L^{p-q}} = \mu \|d_\Omega\|_\infty^a, \quad (5.10)$$

pois

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(|\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \lambda_p^{-\frac{q}{p}} \right) = |\Omega| \|d_\Omega\|_\infty^q \quad \text{e} \quad \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{L^{p-q}} = 0.$$

Da expressão (5.10) segue que

$$\mu \geq \|d_\Omega\|_\infty^{-a},$$

que é claramente uma contradição com a hipótese. $\square$

Afirmção 5.1.2. *Se $0 < \mu < \|d_\Omega\|_\infty^{-a}$, então*

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p^{p-1} < \infty.$$

Demonstração. Com efeito, multiplicando ambos os lados da desigualdade (5.6) por $\|\nabla u_p\|_p^{-1}$, obtemos

$$\|\nabla u_p\|_p^{p-1} \leq |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \lambda_p^{-\frac{q}{p}} \|\nabla u_p\|_p^{q-1} + \mu \lambda_p^{-\frac{a}{p}} \|\nabla u_p\|_p^{p-1},$$

se, e somente se

$$\|\nabla u_p\|_p^{p-1} \leq |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \lambda_p^{-\frac{q}{p}} \frac{1}{1 - \mu \lambda_p^{-\frac{a}{p}}} \|\nabla u_p\|_p^{q-1}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p^{p-1} &\leq \limsup_{p \rightarrow \infty} \left(|\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \lambda_p^{-\frac{q}{p}} \frac{1}{1 - \mu \lambda_p^{-\frac{a}{p}}} \|\nabla u_p\|_p^{q-1} \right) \\ &\leq \limsup_{p \rightarrow \infty} \left(|\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \lambda_p^{-\frac{q}{p}} \frac{1}{1 - \mu \lambda_p^{-\frac{a}{p}}} \right) \limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p^{q-1} \\ &\leq \lim_{p \rightarrow \infty} \left(|\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \lambda_p^{-\frac{q}{p}} \frac{1}{1 - \mu \lambda_p^{-\frac{a}{p}}} \right) \limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p^{q-1}. \end{aligned}$$

Daí, aplicando (5.9), a condição $0 < \mu < \|d_\Omega\|_\infty^{-a}$ e a Afirmação 5.1.1, concluímos

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p^{p-1} \leq |\Omega| \|d_\Omega\|_\infty^a \frac{1}{1 - \mu \|d_\Omega\|_\infty^a} < \infty.$$

□

5.2 A convergência uniforme para d_Ω

Tendo em vista a Afirmação 5.1.1, podemos utilizar o Lema 4.1.5 com $C = 1$. Portanto, quando $p \rightarrow \infty$, temos que, a menos de subsequências, u_p converge uniformemente para uma função $u_\infty \in W_0^{1,\infty}(\Omega) \cap C_0(\overline{\Omega})$, tal que

$$0 \leq u_\infty(x) \leq d_\Omega(x), \text{ para todo } x \in \overline{\Omega}. \quad (5.11)$$

Da convergência uniforme de $u_p \rightarrow u_\infty$ e da segunda desigualdade em (5.11) temos

$$\lim_{p \rightarrow \infty} (\|d_\Omega\|_q^q - \|u_p\|_q^q) = \lim_{p \rightarrow \infty} \int_\Omega (d_\Omega^q - u_p^q) dx = \int_\Omega (d_\Omega^q - u_\infty^q) dx = \|d_\Omega\|_q^q - \|u_\infty\|_q^q \geq 0$$

e, portanto,

$$\|d_\Omega\|_q \geq \|u_\infty\|_q. \quad (5.12)$$

Com o intuito de obter a desigualdade $\|d_\Omega\|_q \leq \|u_\infty\|_q$, definamos o seguinte problema de Dirichlet auxiliar

$$\begin{cases} -\Delta_p u = |u|^{q-2} u + h_p, & \text{em } \Omega \\ u = 0, & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases} \quad (A_1)$$

em que

$$h_p := \mu u_p^{a-1} |\nabla u_p|^{p-a}.$$

Por hipótese, temos que $|\nabla u_p| \in L^\infty(\Omega)$. Além disso, como estamos supondo que p é suficientemente grande, podemos assumir que $p > N$ e daí, a continuidade da imersão $W_0^{1,p}(\Omega) \hookrightarrow C(\overline{\Omega})$ (consequência da bem conhecida desigualdade de Morrey) assegura que $u_p \in L^\infty(\Omega)$. Combinando estes fatos, concluímos que

$$h_p \in L^\infty(\Omega).$$

Vemos que a solução u_p do problema (A) também é solução do problema (A_1) . Além disso, u_p é solução única de (A_1) , de acordo com o Corolário E.0.2.

Na sequência, exibiremos uma estimativa para a função h_p do problema (A_1) , a qual permitirá obter o valor de certa integral. Além disso, considerando o funcional energia associado a este problema, decorre que $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ minimiza tal funcional energia. Estes fatos serão aplicados para obtermos que $\|d_\Omega\|_q \leq \|u_\infty\|_q$.

Para obter a estimativa para a função h_p consideremos

$$\tilde{p} = p, \quad \tilde{q} = \frac{p}{a-1} \quad \text{e} \quad \tilde{r} = \frac{p}{p-a}, \quad \text{donde} \quad \frac{1}{\tilde{p}} + \frac{1}{\tilde{q}} + \frac{1}{\tilde{r}} = 1.$$

Pelo Corolário B.0.2 e pela desigualdade da imersão dada em (5.3), temos

$$\begin{aligned} \|h_p\|_1 &\leq \mu \left(\int_\Omega dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_\Omega (|u_p|^{a-1})^{\frac{p}{a-1}} dx \right)^{\frac{a-1}{p}} \left(\int_\Omega (|\nabla u_p|^{p-a})^{\frac{p}{p-a}} dx \right)^{\frac{p-a}{p}} \\ &\leq \mu |\Omega|^{\frac{1}{p}} \|u_p\|_p^{a-1} \|\nabla u_p\|_p^{p-a} \leq \mu |\Omega|^{\frac{1}{p}} \lambda_p^{-\frac{(a-1)}{p}} \|\nabla u_p\|_p^{p-1}. \end{aligned}$$

Além disso, levando em conta a expressão (5.9) e a Afirmação 5.1.2, concluímos que

$$\begin{aligned} \limsup_{p \rightarrow \infty} \|h_p\|_1 &\leq \limsup_{p \rightarrow \infty} \left(\mu |\Omega|^{\frac{1}{p}} \lambda_p^{-\frac{(a-1)}{p}} \|\nabla u_p\|_p^{p-1} \right) \\ &\leq \limsup_{p \rightarrow \infty} \left(\mu |\Omega|^{\frac{1}{p}} \lambda_p^{-\frac{(a-1)}{p}} \right) \limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p^{p-1} \\ &\leq \mu \lim_{p \rightarrow \infty} \left(|\Omega|^{\frac{1}{p}} \lambda_p^{-\frac{(a-1)}{p}} \right) \limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p^{p-1} \\ &\leq \mu \|d_\Omega\|_\infty^{a-1} \limsup_{p \rightarrow \infty} \|\nabla u_p\|_p^{p-1} < \infty. \end{aligned} \tag{5.13}$$

Por outro lado, também temos

$$\left| \int_\Omega h_p(u_\infty - u_p) dx \right| \leq \|h_p\|_1 \|u_\infty - u_p\|_\infty,$$

e passando ao limite a ambos os lados, da última desigualdade (5.13) e pelo fato da

convergência $u_p \rightarrow u_\infty$ ser uniforme, chegamos

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left| \int_{\Omega} h_p(u_\infty - u_p) dx \right| \leq \limsup_{p \rightarrow \infty} \|h_p\|_1 \lim_{p \rightarrow \infty} \|u_\infty - u_p\|_\infty = 0.$$

Daí, vem

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \int_{\Omega} h_p(u_\infty - u_p) dx = 0. \quad (5.14)$$

Recordemos que o funcional energia associado a (A_1) é definido por

$$I_p(v) := \frac{1}{p} \|\nabla v\|_p^p - \frac{1}{q} \|v\|_q^q - \int_{\Omega} h_p v dx, \text{ para todo } v \in W_0^{1,p}(\Omega). \quad (5.15)$$

Este funcional é limitado inferiormente e coercivo. Portanto, uma técnica padrão de minimização direta garante a existência de um minimizador global v_p . Segue-se deste fato que v_p é uma solução fraca de (A_1) . É fácil verificar que I_p assume valores negativos e, como consequência, v_p não é a função nula. Além disso, podemos verificar que $I_p(|v_p|) \leq I_p(v_p)$, garantindo assim que v_p é não negativa (pois $|v_p|$ é um minimizador). Aplicando o princípio do máximo forte para (A_1) concluímos que $v_p > 0$ em Ω e isso mostra que v_p é, de fato, uma solução fraca de (A) . Por fim, da unicidade de soluções para (A) , dada pelo Corolário E.0.2, temos $v_p = u_p$. Portanto, $u_p \in W_0^{1,p}(\Omega)$ minimiza o funcional energia I_p .

Das propriedades da função distância, dadas na Seção 1.1, d_Ω também está em $W_0^{1,p}(\Omega)$. Logo,

$$I_p(u_p) \leq I_p(d_\Omega).$$

Daí, temos

$$\frac{1}{p} \|\nabla u_p\|_p^p - \frac{1}{q} \|u_p\|_q^q - \int_{\Omega} h_p u_p dx \leq \frac{1}{p} \|\nabla d_\Omega\|_p^p - \frac{1}{q} \|d_\Omega\|_q^q - \int_{\Omega} h_p d_\Omega dx,$$

se, e somente se,

$$\frac{1}{q} (\|d_\Omega\|_q^q - \|u_p\|_q^q) + \int_{\Omega} h_p (d_\Omega - u_p) dx \leq \frac{1}{p} \int_{\Omega} |\nabla d_\Omega|^p dx - \frac{1}{p} \|\nabla u_p\|_p^p.$$

Lembramos que $|\nabla d_\Omega(x)| = 1$ q.t.p. em Ω , veja a Seção 1.1. Assim, da desigualdade anterior, decorre

$$\frac{1}{q} (\|d_\Omega\|_q^q - \|u_p\|_q^q) + \int_{\Omega} h_p (d_\Omega - u_p) dx \leq \frac{1}{p} |\Omega|. \quad (5.16)$$

Da desigualdade (5.11) e devido a termos $h_p \geq 0$ (pois $u_p > 0$), concluímos que $\int_\Omega h_p(d_\Omega - u_\infty)dx \geq 0$ e, com isto, obtemos

$$\int_\Omega h_p(d_\Omega - u_p)dx = \int_\Omega h_p(d_\Omega - u_\infty)dx + \int_\Omega h_p(u_\infty - u_p)dx \geq \int_\Omega h_p(u_\infty - u_p)dx.$$

Daí, substituindo na expressão (5.16), chegamos a

$$\frac{1}{q} (\|d_\Omega\|_q^q - \|u_p\|_q^q) + \int_\Omega h_p(u_\infty - u_p) dx \leq \frac{1}{p} |\Omega|.$$

Desta última desigualdade, pela convergência uniforme de u_p e pela convergência dada em (5.14), concluímos que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{q} (\|d_\Omega\|_q^q - \|u_p\|_q^q) + \int_\Omega h_p(u_\infty - u_p) dx \right) \leq \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p} |\Omega| = 0,$$

isto é, $\|d_\Omega\|_q^q - \|u_\infty\|_q^q \leq 0$. Portanto,

$$\|d_\Omega\|_q \leq \|u_\infty\|_q. \quad (5.17)$$

Agora, das desigualdades (5.12) e (5.17), obtemos

$$\|d_\Omega\|_q = \|u_\infty\|_q. \quad (5.18)$$

Isto é,

$$\int_\Omega (d_\Omega^q - u_\infty^q) dx = 0$$

Como (5.11) garante que $d_\Omega(x) \geq u_\infty(x)$, para todo $x \in \bar{\Omega}$, obtemos $u_\infty = d_\Omega$ em $\bar{\Omega}$. Devido ao limite da função ser sempre d_Ω , concluímos que

$$\lim_{p \rightarrow \infty} u_p = d_\Omega, \quad \text{uniformemente em } \bar{\Omega}.$$

Observação 5.2.1. *É simples verificar que $w_p = \lambda^{\frac{1}{p-q}} u_p$ é solução de (A), com $\lambda > 0$. Note que $\lim_{p \rightarrow \infty} w_p = \lim_{p \rightarrow \infty} u_p = d_\Omega$ (uniformemente).*

Referências

- [1] R. Adams: Sobolev Spaces, Academic Press, New York 1975.
- [2] W. Allegreto, Y.X. Huang: A Picone's identity for the p -Laplacian and applications, *Nonlinear Anal.* **32** (1998) 819–830.
- [3] C. Bennett, R. Sharpley. Interpolation of Operators. Orlando, Florida: Academic Press (1988). Pure and Applied Mathematics, 129.
- [4] T. Bhattacharya: An elementary proof of the Harnack inequality for non-negative infinity-superharmonic functions, *Electron. J. Differential Equations* **2001.44** (2001) 1–8.
- [5] T. Bhattacharya, E. DiBenedetto, J. Manfredi: Limits as $p \rightarrow \infty$ of $\Delta_p u_p = f$ and related extremal problems, *Rend. Sem. Mat. Univ. Pol. Torino Fascicolo Speciale* (1989) 15–68.
- [6] R. J. Biezuner. Equações diferenciais parciais i/ii. Notas de Aula, UFMG, 2010.
- [7] M. Bocea, M. Mihăilescu: On a family of inhomogeneous torsional creep problems, *Proc. Amer. Math. Soc.* **145** (2017) 4397–4409.
- [8] H. Brezis. Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations. Universitext. Springer, New York, 2011.
- [9] H. Bueno, G. Ercole: A quasilinear problem with fast growing gradient, *Applied Mathematics Letters* **26** (2013) 520–523.
- [10] A. Cianchi, L. Pick: Sobolev embeddings into BMO , VMO and L^∞ , *Ark. Math.* **36** (1998) 317–340.

-
- [11] A. Cianchi, V. G. Maz'ya: Global Lipschitz regularity for a class of quasilinear elliptic equations. *Comm. Partial Differential Equations*, **36** (2011) 100–133.
- [12] S. Costea: Sobolev-Lorentz spaces in the Euclidean setting and counterexamples. *Nonlinear Analysis. Theory, Methods and Applications*, 152 (2017), 149–182.
- [13] de Araujo A.L.A, L.F.O. Faria: Positive solutions of quasilinear elliptic equations with exponential nonlinearity combined with convection term, *J. Differential Equations* **267** (2019) 4589–4608.
- [14] de Araujo A.L.A, G. Ercole, J.C. Lanazca Vargas: The limiting behavior of solutions to p -Laplacian problems with convection and exponential terms, *Topological Methods in Nonlinear Analysis*, 64 (2024), 339-359
- [15] de Araujo A.L.A, M. Montenegro: Existence of solution for a nonlinear equation with supercritical exponential growth, *J. Fixed Point Theory Appl.* **25:26** (2023).
- [16] J.I. Díaz, J.E. Saa: Existence et unicité de solutions positives pour certaines équations elliptiques quasilinéaires, *C.R. Acad. Sci., Paris* **305** (Série I) (1987) 521–524.
- [17] P. Drábek. The p -Laplacian-mascot of nonlinear analysis. *Acta Mathematica Universitatis Comeniana*, 76(1), (2007) 85-98.
- [18] G. Ercole: On a global gradient estimate in p -Laplacian problems, aceito para publicação em *Israel Journal of Mathematics* (preprint disponível em <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.05538>).
- [19] G. Ercole: On a family of problems driven by rapidly growing operators, *Monatsh. Math.* **202** (2023), 263-279.
- [20] G. Ercole, G.M. Figueiredo, V.M. Magalhães and G.A. Pereira: The limiting behavior of global minimizers in non-reflexive Orlicz-Sobolev spaces, *Proc. Amer. Math. Soc.* **150** (2022) 5267–5280.
- [21] D.G. de Figueiredo, J.P. Gossez, H.R. Quoirin, P. Ubilla: Elliptic equations involving the p -Laplacian and a gradient term having natural growth, *Rev. Mat. Iberoam.* **35** (2019) 173–194.

-
- [22] M. Fărcășeanu, M. Mihăilescu: On a family of torsional creep problems involving rapidly growing operators in divergence form, *Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A* **149** (2019) 495–510.
- [23] M. Fărcășeanu, M. Mihăilescu, D. Stancu-Dumitru: On the convergence of the sequence of solutions for a family of eigenvalue problems, *Math. Methods Appl. Sci.* **40** (2017) 6919-6926.
- [24] J. Garcia Azorero, I. Peral Alonso: On an Emden-Fowler type equation, *Nonlinear Anal.* **18** (1992) 1085–1097.
- [25] A. Grecu, D. Stancu-Dumitru: The asymptotic behavior of solutions to a class of inhomogeneous problems: an Orlicz–Sobolev space approach, *Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ.* **38** (2021) 1–20.
- [26] J. Juutinen, P. Lindqvist, J. Manfredi: The ∞ –eigenvalue problem, *Arch. Ration. Mech. Anal.* **148** (1999) 89–105.
- [27] B. Kawohl: On a family of torsional creep problems, *J. Reine Angew. Math.* **410** (1990) 1–22.
- [28] M.C. Leon: Existence results for quasilinear problems via ordered sub and supersolutions. *Ann. Fac. Sciences Toulouse.* **6** (1997), 591-608.
- [29] G.M. Lieberman: Boundary regularity for solutions of degenerate elliptic equations, *Nonlinear Anal.* **12** (1988) 1203–1219.
- [30] J. Manfredi, P. Lindqvist: Note on ∞ -superharmonic functions, *Rev. Mat. Univ. Complut. Madrid* **10** (1997) 471–480.
- [31] M. Mihăilescu, D. Stancu-Dumitru, C. Varga: The convergence of nonnegative solutions for the family of problems $-\Delta_p u = \lambda e^u$ as $p \rightarrow \infty$, *ESAIM Control Optim. Calc. Var.* **24** (2018) 569–578.
- [32] I. Peral: Multiplicity of Solutions for the p -Laplacian, *Second school of nonlinear functional analysis and applications to differential equation*. Miramare-Trieste: International center for theoretical physics, 21 de abril - 9 de maio. 1997.
- [33] D. SMART: Fixed point theorems, Cambridge University Press, New York, 1974.

-
- [34] S. Sakaguchi: Concavity properties of solutions to some degenerated quasilinear elliptic Dirichlet problems, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci* **14** (1987), 403–421.
- [35] Y. Yu : Some properties of the ground states of the infinity Laplacian, *Indiana Univ. Math. J.* **56** (2007) 947–964 .

Apêndice A

Espaço de Sobolev

Neste primeiro apêndice, apresentamos alguns resultados relacionados ao Espaço de Sobolev. Para mais detalhes, ver [8].

Definição A.0.1. *Seja Ω subconjunto aberto de $\mathbb{R}^N$ e seja $1 \leq p \leq \infty$. Definimos o Espaço de Sobolev $W^{1,p}(\Omega)$ por*

$$W^{1,p}(\Omega) = \left\{ u \in L^p(\Omega), \text{ tal que existem } \frac{\partial u}{\partial x_j} \in L^p(\Omega), j = 1, \dots, N \right\}.$$

Para cada $u \in W^{1,p}(\Omega)$, a $\frac{\partial u}{\partial x_j}$ denota a j -ésima derivada fraca de u , isto é

$$\int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_j} \varphi dx, \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

O espaço de Sobolev munido com a norma

$$\|u\|_{1,p} := \begin{cases} \left(\|u\|_p^p + \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_p^p \right)^{\frac{1}{p}}, & \text{se } 1 \leq p < \infty, \\ \|u\|_\infty + \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right\|_\infty, & \text{se } p = \infty. \end{cases}$$

é um espaço de Banach.

Dada $u \in W^{1,p}(\Omega)$, definimos

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_N} \right)$$

e podemos escrever o espaço $W^{1,p}(\Omega)$ como sendo

$$W^{1,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega), \text{ tal que } |\nabla u| \in L^p(\Omega)\},$$

com a norma

$$\|u\|_{1,p} = \|u\|_p + \|\nabla u\|_p.$$

Definição A.0.2. *Definimos $W_0^{1,p}(\Omega)$, sub espaço de $W^{1,p}(\Omega)$, como*

$$W_0^{1,p}(\Omega) := \overline{C_0^\infty(\Omega)}^{\|\cdot\|_{1,p}}$$

Teorema A.0.3 (Desigualdade de Poincaré). *Seja Ω um domínio limitado em uma direção. Então, existe uma constante $C = C(p, \Omega)$, tal que para todo $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$,*

$$\|u\|_p \leq C \|\nabla u\|_p.$$

Observação A.0.4. *Da desigualdade de Poincaré temos que as normas $\|u\|_{1,p}$ e $\|\nabla u\|_p$ são equivalentes em $W_0^{1,p}(\Omega)$.*

Apêndice B

Desigualdade de Hölder

Vamos assumir que Ω é um domínio limitado de $\mathbb{R}^N$, para $N \geq 2$. Denotamos por $\|u\|_s$ à norma do espaço $L^s(\Omega)$, para $1 \leq s \leq \infty$.

Teorema B.0.1. *Sejam $1 < p < \infty$ e q o conjugado de p , definido por $q = \frac{p}{p-1}$, isto é $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, em que $1 < q < \infty$. Se $u \in L^p(\Omega)$ e $v \in L^q(\Omega)$, então $uv \in L^1(\Omega)$ e*

$$\int_{\Omega} |u(x)v(x)| dx \leq \|u\|_p \|v\|_q.$$

A igualdade acontece se, e somente se, $|u|^p$ e $|v|^q$ são proporcionais q.t.p. em Ω .

Corolário B.0.2. *Sejam $p, q, r \in (0, \infty)$, tais que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = 1$. Se $u \in L^p(\Omega)$, $v \in L^q(\Omega)$ e $w \in L^r(\Omega)$, então $uvw \in L^1(\Omega)$ e*

$$\int_{\Omega} |u(x)v(x)w(x)| dx \leq \|u\|_p \|v\|_q \|w\|_r.$$

Proposição B.0.3. *Suponha $1 \leq p \leq q \leq \infty$. Se $u \in L^q(\Omega)$, então $u \in L^p(\Omega)$ e $\|u\|_p \leq |\Omega|^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|u\|_q$. Além disso, a imersão $L^q(\Omega) \hookrightarrow L^p(\Omega)$ é contínua. Se $u \in L^\infty(\Omega)$, então $\lim_{p \rightarrow \infty} \|u\|_p = \|u\|_\infty$.*

Para mais detalhes, veja [1].

Definição B.0.4. *Dado $x \in \mathbb{R}^N$, denotamos os conjuntos*

$$\mathbb{R}_+^N = \{x = (x', x_N) \in \mathbb{R}^N, x_N > 0\}, \text{ em que } x' = (x_1, x_2, \dots, x_{N-1}) \in \mathbb{R}^{N-1} \text{ com}$$

$$|x'| = \left(\sum_{i=1}^{N-1} x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

$$Q = \{x = (x', x_N) \in \mathbb{R}^N, |x'| < 1, e |x_N| < 1\}, Q_+ = Q \cap \mathbb{R}_+^N, e$$

$$Q_0 = \{x = (x', 0) \in \mathbb{R}^N, |x'| < 1\}.$$

Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ conjunto aberto. Dizemos que Ω é um **conjunto de classe $C^{0,1}$** se para cada $x \in \partial\Omega$, existe uma vizinhança U de $x \in \mathbb{R}^N$ e uma aplicação bijetiva $H : Q \rightarrow U$, chamada gráfico local, tal que

$$i) H \in C^1(\overline{\Omega}),$$

$$ii) H^{-1} \in C^1(\overline{U}),$$

$$iii) H(Q_+) = U \cap Q,$$

$$iv) H(Q_0) = U \cap \partial\Omega.$$

Definição B.0.5. Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ um domínio limitado. Dizemos que $\partial\Omega$ é de classe **$C^{1,\gamma}$** , com $\gamma \in (0, 1]$, se para todo $\partial\Omega$, existe uma bola $B \subset \mathbb{R}^N$, um aberto $W \subset \mathbb{R}^N$ e uma aplicação bijetora $\psi : B \rightarrow W$, tal que

$$i) \psi(\Omega \cap B) \subset \mathbb{R}_+^N,$$

$$ii) \psi(\partial\Omega \cap B) \subset \partial\mathbb{R}_+^N,$$

$$iii) \psi \in C^{1,\gamma}(B), \psi^{-1} \in C^{1,\gamma}(W)$$

Quando $\partial\Omega$ for de classe $C^{1,\gamma}$, dizemos que Ω é um **domínio de classe $C^{1,\gamma}$** .

Apêndice C

Princípio de Comparação

Teorema C.0.1. *Seja Ω um domínio limitado em $\mathbb{R}^N$ com fronteira suave. Sejam $u_1, u_2 \in W_0^{1,p}(\Omega)$ satisfazendo (no sentido fraco)*

$$\begin{cases} -\Delta_p u_1 \leq -\Delta_p u_2 & \text{em } \Omega, \\ u_1 \leq u_2 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases}$$

Então,

$$u_1 \leq u_2, \text{ em } \Omega.$$

Demonstração. Ver [32], Lema A.0.7. □

Apêndice D

Método de sub-supersolução

As definições seguintes se referem ao problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta_p u = g(x, u) & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases} \quad (\text{D.1})$$

e podem ser encontradas em [28]. Consideramos $p > 1$ e $q = \frac{p}{p-1}$ o conjugado de p ,

Definição D.0.1. *Seja $\underline{u} \in W_0^{1,p}(\Omega)$ tal que $g(x, \underline{u}(x)) \in L^q(\Omega)$. Dizemos que $\underline{u}$ é uma **subsolução** para (D.1) se $\underline{u} \leq 0$ em $\partial\Omega$ e*

$$\int_{\Omega} |\nabla \underline{u}|^{p-2} \nabla \underline{u} \cdot \nabla \phi dx \leq \int_{\Omega} g(x, \underline{u}) \phi dx,$$

para toda $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$, $\phi \geq 0$.

Definição D.0.2. *Seja $\bar{u} \in W_0^{1,p}(\Omega)$ tal que $g(x, \bar{u}(x)) \in L^q(\Omega)$. Dizemos que $\bar{u}$ é uma **supersolução** para (D.1) se $\bar{u} \geq 0$ em $\partial\Omega$ e*

$$\int_{\Omega} |\nabla \bar{u}|^{p-2} \nabla \bar{u} \cdot \nabla \phi dx \geq \int_{\Omega} g(x, \bar{u}) \phi dx,$$

para toda $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$, $\phi \geq 0$.

O seguinte resultado de existência é uma versão simplificada do Teorema 2.1, de [28].

Teorema D.0.3. *Sejam $\underline{u}$ e $\bar{u}$ sub e supersoluções para (D.1), respectivamente. Suponha que $\max\{\|\underline{u}\|_\infty, \|\bar{u}\|_\infty\} \leq M$, para alguma constante positiva M e para todo $x \in \bar{\Omega}$. Suponha, ainda, que $g(x, t) \in C(\bar{\Omega} \times [0, M])$. Então o problema (D.1) possui uma solução*

fraca $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ tal que

$$\underline{u}(x) \leq u(x) \leq \bar{u}(x), \quad \text{para todo } x \in \bar{\Omega}.$$

Definição D.0.4. *Seja $U = T(u) \in W_0^{1,p}(\Omega)$ tal que $g_u(x, U(x))$ pertence ao espaço $L^{p'}(\Omega)$. Então, dizemos que U é uma **solução fraca** para (2.19) se*

$$\int_{\Omega} |\nabla U|^{p-2} \nabla U \cdot \nabla \phi dx = \int_{\Omega} g_u(x, U) \phi dx,$$

para toda $\phi \in C_0^\infty(\Omega)$. (Uma vez que $C_0^\infty(\Omega)$ é denso em $W_0^{1,p}(\Omega)$, podemos considerar $\phi \in W_0^{1,p}(\Omega)$ nesta definição.)

Apêndice E

Unicidade de soluções positivas para certas equações elíticas quase lineares

Em [16] Díaz e Saa, estudaram existência e unicidade de soluções positivas para o seguinte problema

$$\begin{cases} -\Delta_p u = f(x, u), & u \geq 0 \text{ e } u \not\equiv 0 \text{ em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (\text{E.1})$$

em que $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ aberto, limitado e suave e $f(x, r) : \Omega \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaz:

(H_1) para quase todo $x \in \Omega$, a função $r \mapsto f(x, r)$ é contínua em $[0, \infty)$. Além disso, para todo $r \geq 0$, a função $x \mapsto f(x, r)$ pertence a $L^\infty(\Omega)$;

(H_2) para quase todo $x \in \Omega$, a função $r \mapsto \frac{f(x, r)}{r^{p-1}}$ é estritamente decrescente em $(0, \infty)$;

(H_3) existe $C > 0$, tal que $f(x, r) \leq C(r^{p-1} + 1)$, q.t.p. em $x \in \Omega$ e para todo $r \geq 0$.

Teorema E.0.1. ([16], Théorème 1) *Sob as hipóteses (H_1), (H_2) e (H_3) o problema (E.1) admite, no máximo, uma solução.*

Corolário E.0.2. *Sejam $1 < q < p$, $\lambda > 0$ e $h \in L^\infty(\Omega)$, $h \geq 0$. O problema*

$$\begin{cases} -\Delta_p u = \lambda u^{q-1} + h & \text{em } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega. \end{cases}$$

admite, no máximo, uma solução.

Demonstração. Com efeito:

-
- (H₁) para quase todo $x \in \Omega$, a função $r \mapsto f(x, r) := \lambda r^{q-1} + h(x)$ é contínua em $[0, \infty)$ e, para todo $r \geq 0$, a função $x \mapsto f(x, r) = \lambda r^{q-1} + h(x)$ pertence a $L^\infty(\Omega)$;
- (H₂) para quase todo $x \in \Omega$, a função $r \mapsto \frac{f(x, r)}{r^{p-1}} = \frac{\lambda}{r^{p-q}} + \frac{h(x)}{r^{p-1}}$ é estritamente decrescente em $(0, \infty)$;
- (H₃) como $\frac{f(x, r)}{r^{p-1} + 1} \leq \frac{\lambda r^{q-1} + \|h\|_\infty}{r^{p-1} + 1}$ e este último quociente é limitado para $r \in [0, \infty)$, existe $C > 0$ tal que $f(x, r) \leq C(r^{p-1} + 1)$.

□

Apêndice F

Imersões Compactas

Teorema F.0.1. *Seja $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ aberto. Então, para todo $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ e para todo $0 < \alpha \leq \beta \leq 1$ valem as seguintes imersões:*

$$C^{k+1}(\overline{\Omega}) \hookrightarrow C^k(\overline{\Omega}),$$

$$C^{k,\alpha}(\overline{\Omega}) \hookrightarrow C^k(\overline{\Omega}),$$

$$C^{k,\beta}(\overline{\Omega}) \hookrightarrow C^{k,\alpha}(\overline{\Omega}).$$

Se Ω é limitado, então as duas últimas imersões são compactas e se Ω é convexo e limitado, todas as três imersões são compactas.

Demonstração. Ver [6], Teorema 9.6. □

Apêndice G

Teorema do Ponto fixo de Schauder

Definição G.0.1. Dizemos que um espaço topológico F tem a **propriedade do ponto fixo**, se toda aplicação contínua $T : F \rightarrow F$ tem um ponto fixo. Isto é, se para toda aplicação contínua $T : F \rightarrow F$, existe $x_0 \in F$, tal que $T(x_0) = x_0$.

Teorema G.0.2. Seja F um espaço de Banach, e seja C conjunto convexo, fechado e não vazio em F . Seja $T : C \rightarrow C$ uma aplicação contínua tal que $T(C) \subset K$, em que K é um subconjunto compacto de C . Então, T tem um ponto fixo em K .

Demonstração. Ver [33]

□