

Anexos:

Tabela 1: Características descritivas das crianças do estudo, referentes a sexo, nível sócio-econômico da família e diagnóstico

Características		Grupo visão subnormal		Grupo controle	
		Grupos etários		Grupos etários	
		2 anos	6 anos	2 anos	6 anos
Sexo	Feminino	2	5	2	5
	Masculino	5	3	5	3
NSE [†]	A1	-	-	-	-
	A2	1	-	1	-
	B1	1	-	1	-
	B2	1	4	1	3
	C1	2	-	-	1
	C2	-	1	1	1
	D	2	3	3	3
E	-	-	-	-	
Diagnóstico ^{††}	Retinopatia da prematuridade	2	3		
	Hemorragia do vítreo por tocotraumatismo	1			
	Nistagmo/estrabismo	2	1		
	Catarata Congênita	1	1		
	Coloboma de disco óptico	-	1		
	Baixa acuidade visual cortical	-	1		
	Seqüela de toxoplasmose	1	-		
	Glaucoma congênito	-	1		

[†] NSE: Nível socioeconômico segundo a ABEP.

^{††} Diagnóstico: condições clínicas que possivelmente causaram a visão subnormal.

Figura 1: Gráficos ilustrativos dos efeitos de interação idade x grupo







Tabela 2: Média e (desvio padrão) dos escores brutos obtidos no teste PEDI, nas áreas de auto-cuidado e mobilidade, das partes de habilidades funcionais e assistência do cuidador, nos quatro sub-grupos do estudo

Área de Desempenho Funcional		Grupo Visão				Valor-p		
		Subnormal		Grupo Controle		idade	grupo	interação
		2 anos	6 anos	2 anos	6 anos			
Habilidades Funcionais	Autocuidado	31,86 (10,76)	67,13 (5,59)	47,29 (8,26)	70,25 (2,65)	p<0,001*	p=0,002*	p=0,029*
	Mobilidade	39,71 (11,22)	55,75 (2,65)	51,00 (3,46)	57,63 (1,59)	p<0,001*	P=0,005*	p=0,038*
Assistência do cuidador	Autocuidado	12,57 (7,72)	35,00 (3,46)	21,29 (7,74)	38,13 (2,16)	p<0,001*	p=0,008*	p=0,189
	Mobilidade	22,29 (5,28)	31,88 (2,10)	30,29 (1,11)	34,13 (0,99)	p<0,001*	P<0,001*	p=0,011*

*p<0,05