


LEGENDA

- Povoado
 - + Ponto Cotado
 - Limite Municipal
 - - - Estrada
 - Drenagem
 - Curva de nível
- PONTOS**
- Biotita xisto
 - Biotita xisto com intercalação de metachert cinza-claro
 - ◆ Biotita xisto com intercalação de metachert cinza-escuro sulfetado
 - ▲ Cianita-granada-biotita xisto
 - ▼ Diopsídio sulfetado
 - ★ Estaurolita-granada-biotita xisto
 - FFB fácies silicato e óxido e metachert cinza-claro
 - ◇ Formação ferrífera bandada da Form. Capelinha
 - Formação ferrífera bandada fácies silicato
 - ▽ Grafita xisto
 - ☆ Granada-biotita xisto
 - ⊗ Granada-biotita xisto intercalado com metachert cinza-claro
 - Granada-biotita xisto intercalado com metachert cinza-escuro sulfetado
 - ⊙ Granada-cianita xisto e biotita xisto
 - ⊙ Granito
 - ⊙ Metabasalto, metadiabásio e plagiogranito
 - ⊙ Metachert cinza-escuro sulfetado
 - ⊙ Metachert de coloração branca, puro
 - ⊙ Metachert de coloração cinza-clara a branca, micáceo e impuro
 - ⊙ Metachert de coloração cinza-clara, puro
 - ⊙ Metagabro
 - ⊙ Quartzito



Escala: 1:50.000

Caracterização das Rochas Metassedimentares Sulfetadas e Ferríferas da Região de Ribeirão da Folha-Baixa Quente, Município de Minas Novas, MG (Mapa de Pontos)		
Estado: MG	Data: Fevereiro/2005	Autora: Gláucia Nascimento Queiroga
Município: Minas Novas	Escala: 1:50.000	Datum: UTM/ SAD-69
Orientadores: Antônio Carlos Pedrosa Soares Joel Jean Gabriel Quéméneur		
Apoio: - CPMTG/ IGC - CNPq - DECART/ IGC		